

Замѣтки о стрекозахъ (Odonata).

А. Браунера (Одесса).

Лѣтомъ 1902 года мнѣ пришлось собирать стрекозъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: на Кавказѣ между Новороссійскомъ и Адлеромъ, у г. Екатеринодара, а также въ Крыму, въ 35 верстахъ отъ г. Керчи (деревни Каялы-Сартъ и Темешъ). Кромѣ того мнѣ были доставлены сборы гг.: Н. Г. Лигнау съ южн. бер. Крыма (Ай-Тодоръ и Ай-Петри), А. Т. Талалаева изъ-подъ г. Измаила и С. А. Бутурлина съ устьевъ С. Двины. Списокъ стрекозъ этихъ сборовъ я и сообщаю въ настоящей замѣткѣ, принося глубокую благодарность вышепоименованнымъ лицамъ.

I. *Архангельская губ. (gouv^t d'Arkhangelsk)*: г. Архангельскъ (Arkhangelsk), Чижовы о-ва въ дельтѣ С. Двины (îles Tchijovy, delta du Dvina). — 20. VII. 1902:

Somatochlora alpestris Selys.

Aeschna juncea L.

„ *grandis* L.

Въ Европ. Россіи первый видъ до сихъ поръ былъ найденъ только въ Финляндіи, второй же и третій — повсюду.

II. *Бессарабская губ. (Bessarabie)*: около г. Измаила (env. d'Ismaïl). — 26. VI. 1902:

Crocothemis erythraea Brullé, ♂ ♀.

Libellula albistyla Selys.

Anax parthenope Selys, ♂ ♀. — Самецъ отличается отъ днѣпровскихъ ♂♂ нѣсколько болѣе темнымъ налетомъ на крыльяхъ.

Anax formosus V. d. L.

III. *Крымъ (Crimée)*:

1. Южн. берегъ (côte S):

Libellula brunnea Fonsc. — ♀ около Ай-Тодора (Aï-Todor); ad. ♂ у подножія Ай-Петри (Aï-Pétri).

Anax parthenope Selys. — 2 ♂ около Ай-Тодора (env. d'Aï-Todor), 16. VII. 1902.

Lestes barbara Fabr. — ♀ около Ай-Тодора (env. d'Aï-Todor).

Ischnura pumilio Charp. — 2 ♂ и ♀, при чемъ послѣдняя темной разновидности. Этотъ видъ былъ мною найденъ только одинъ разъ около Одессы въ 1893 г.

Ischnura elegans V. d. L., ♂.

2. Степные пруды въ 35 верст. на З. отъ г. Керчи, у деревень Темешъ и Каялы-Сартъ (steppes près Kertch). — 15. VI. 1902:

Ischnura elegans V. d. L.

Erythromma najas Hansem.

Enallagma cyathigerum Charp.

Libellula cancellata L.

Libellula brunnea Fonsc.

IV. *Кубанская область* (prov. de Kuban): г. Екатеринодаръ (Eкатеринодар). — 15. V. 1902:

Crocothemis erythraea Brullé, ♀.

Libellula depressa L., ♂.

Aeschna affinis V. d. L.

Calopteryx splendens Harris, 6 ♂, 1 ♀.

Agrion pulchellum V. d. L.

V. *Черноморская губ.* (gouv^t Pontique):

1. Окр. Новороссійска (env. de Novorossiisk). — 17. V. 1902:

Somatochlora metallica V. d. L.

Aeschna rufescens V. d. L., ♀♀. — Много самокъ этого вида пролетало вмѣстѣ съ *Brachytron pratense* и *Somatochlora metallica* вдоль хребта Маркхотъ, занимаясь ловлей насѣкомыхъ.

Brachytron pratense Müll.

Anax parthenope Selys. — У озера Абрау я поймалъ самца этого вида. Онъ оказался тождественнымъ съ днѣпровскими экземплярами изъ окр. Херсона; даже полоска у основанія второго членника брюшка была такой-же золотисто-желтой; между тѣмъ у крымскихъ экземпляровъ я этого не замѣчалъ.

2. Г. Сочи (Sotchi). — 26. V. 1902:

Platycnemis pennipes Pall.

Libellula depressa L., ♂ (ad.).

3. Адлеръ (Adler). — 29—30. V. 1902:

Libellula depressa L., ♂ (ad.).

Libellula fulva Müll. *typica* (nec var. *pontica* Albarda) ♂ (ad.) & ♀, in copula.

Libellula cancellata L.

Libellula albistyla Selys, ♀ (juv.).

Libellula brunnea Fonsc., 2 ♂, 1 ♀.

Calopteryx virgo L., ♂ ♀.

Aeschna rufescens V. d. L., ♂.

Agrion puella V. d. L., ♂.

Agrion pulchellum V. d. L., ♂.

Pyrrhosoma minium Harris.

4. Красная Поляна (Krasnaïa Poliana):

Libellula depressa L., ♂ (ad.).

Изъ этихъ данныхъ можно видѣть, что *Anax parthenope* распространена по всему побережью Чернаго моря; то-же можно сказать отчасти и о *Crocothemis erythraea*, такъ какъ она пока не найдена только въ Крыму. Что касается *Libellula brunnea*, то она впервые мною найдена у Херсона и въ Симферополѣ, а теперь оказалась и на восточномъ побережьи Чернаго моря, а по *Selys* также въ Закавказьи и Малой Азій. *Libellula fulva* найдена была до сихъ поръ въ Казанской и Харьковской губерніяхъ; у Адлера мною найдена типичная ея форма, а не понтійская разновидность, какъ того слѣдовало бы ожидать.
