

разъ говоритъ въ пользу того, что среди генетически близкихъ формъ бываетъ въ некоторыхъ случаяхъ достаточно одного толчка въ одинаковомъ направленіи, чтобы развить совершенно однородную и параллельную эволюционную инерцію. На это я уже имѣлъ случай указывать⁴⁾ и къ этому надѣюсь вскорѣ вернуться по другому поводу.

Additamentum ad descriptionem *Julodis bucharicae* Sem.
1893 (Coleoptera, Buprestidae).

Auctore

Andrea Semenov, petropolitano.

Praeter signa a me in originali hujus speciei descriptione allata (cf. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, pp. 496—497) *Julodis bucharica* differt ab *Jul. variolari* (Pall.) etiam iis quae sequuntur haud exigui momenti insignibus: costâ medianâ pronoti in dimidio basali plerumque minus crassâ et convexâ; lineâ medianâ abdominis aspectu a latere multo magis flexuosâ, laminâ ventrali ultimâ longiore, truncaturâ apicali plagam transversim magis expansam et angustiore, anguste subfalciformem tormante; dorso penis multo fortius longitudinaliter strigoso. Variat omnibus seriebus macularum in elytris praeter internam in vittas plus minusve integras conjunctis (aberr. *vittata* n.); variat etiam elytrorum maculis parvis rotundis ubique inter se late distantibus (aberr. *ordinata* n.).

Long. ♂♀ 24—34,5, lat. 10,5—15 mm.

Area geogr.: inde ab orâ meridionali provinciae Maracandensis (O. Herz!, L. Barshtshevsky!) trans Buchariae provincias: Hissar (L. Barshtshevsky! 1896, Dr. S. Korshinsky!, E. Willberg!, Maurer jr!), Darvaz (exped. B. Grombcezhsky! 1809), Vantsh (ead. exped.! 1889), Kulab, Kabadian (Dr. A. Regel! 1883, Dr. S. Korshinsky!).

Examinavi, praeter specimina originalia, plus 125 exemplaria (♂♀) (coll. P. Semenov).

⁴⁾ Ср. А. Семеновъ, Объ одномъ новомъ родѣ водолюбовъ (Coleoptera, Hydrophilidae) въ связи съ вопросомъ о морфологическомъ (морфоматическомъ) параллелизмѣ (Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, pp. 614—630).