

(parfois peu distinctement) et presque non sinués devant l'extrémité; repli basilaire subrectiligne ou faiblement subsinué, terminé, à l'épaule, en denticule extrêmement faible et menu, qui n'est distinct que lorsqu'on regarde l'insecte un peu obliquement d'en dessous; surface légèrement convexe, finement striée, les stries lisses, les interstries déprimés. Dessous du corps imponctué. Saillie prosternale sans rebord distinct, à l'extrémité, mais garnie de soies comme d'ordinaire. Prosternum ♂ avec un petit espace central légèrement pointillé (mais non concave). Episternes métathoraciques sillonnés à leur bord interne. Dernière plaque ventrale ♂ avec 4 pores sétigères, à son bord postérieur (de chaque côté deux pores rapprochés); ♀ avec 4 pores pareils (mais plus espacés) et quelques pores accessoires, distribués irrégulièrement²⁾ et donnant naissance à des soies plus courtes. Angle apical externe des tibias antérieurs simple, non lobiforme. Tibias intermédiaires ♂ à peine arqués. Long. 8—9 mm.

Hab.: Transcaspienne: aoul (village) Kouï, non loin de la riv. Atrék (C. O. A h n g e r! 17. XI. 1902). — Deux spécimens (1 ♂, 1 ♀), capturés parmi des racines de Salsolacées (coll. S e m e n o v).

Diffère d'*Am. (Harp.) turcménica* T s c h. 1894³⁾, auprès de laquelle elle vient se placer, par ses élytres notablement plus longs et moins arrondis aux côtés, par le prosternum ♂ uni, dépourvu de fovéole et n'offrant, au centre, qu'un petit espace légèrement pointillé, etc.

²⁾ Du moins chez l'unique spécimen ♀ que j'ai sous les yeux.

³⁾ Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXVIII, p. 429.

Species thibetana nova generis *Platysma* (Bon.) Tsch.
(Coleoptera, Carabidae).

Descripſit

T. Tschitscherin, petropolitanus.

***Platysma* (*Derus*) *kozlovi*, sp. n.**

Platysma. *Derus* sensu meo 1896¹⁾ (metathoracis episternis parum elongatis), sed corpore convexiore humerisque valide dentatis. Totum nigrum nitidum, palporum apice flavescenti. Caput mediocre, punctatum, oculis magnis et sat convexis (♂), temporibus brevibus retrorsum convergentibus. Antennae graciles et modice elongatae, humeros parum excedentes. Prothorax quadrato-cordatus, ad latitudinem suam maximam (parum ante medium sitam) longitudine mediâ nonnihil latior (3,5 × 4 mm.), retro satis constrictus, basi quam apex fere recte truncatus vix angustiore, angulis anticis haud prominentibus, lateribus modice arcuatis retrorsum determinate et satis longe sinuatis, angulis posticis rectis apice integro, setâ praeapicali instructis; supra satis convexus, praeter rugulas transversim undulatas laevis, basi punctatâ utrinque bistrigatâ, strigâ interiore longâ, exterâ multo brevior et extus pliculâ longitudinali sat tenui limitatâ; lateribus ante medium utrinque unisetosus, sulculo submarginali angustissimo, callulo marginali tenui. Elytra sat elongato-elliptica lateribus leviter arcuatis, apice haud obtuse rotundata et utrinque modice sinuata, basi truncata; humeris valide dentatis; carinulâ basali subrectâ; supra satis convexa, punctato-striata, striis retrorsum attenuatis et laevibus, interstitiis planis, 3^o postice minute bipunctato. Processus prosternalis apice marginatus. Sterni latera sat grosse punctata; episterna prothoracis majore pro parte, mesothoracis — in dimidio postico laevia. Episterna metathoracis latitudine baseos circiter triente longiora, retrorsum valde angustata. Abdominis laminae ventrales ad latera minus grosse punctatae, ultima ad marginem posticum in ♂ bisetosa. Metatarsus posticus extus sulculatus. Onychium subtus glabrum. ♂. Long. 14,5 mm.

Thibet or.: montes Dulan-kit in jugo Kukulnorenſi australi (exped. Kozlovi & Kaznakovi! Init. VIII. 1901). — Solum specimen (1 ♂) (coll. Semenov). — Dedicatum cl. Petro Kozlov, illustri Asiae sinensis exploratori.

Species valde peculiaris, ob corpus supra satis convexum humerosque valide dentatos ab omnibus hucusque cognitis *Deris* facillime dignoscenda.

¹⁾ Cf. Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Sciences St.-Petersb. 1896, pp. 105 seqq.