

plus élargie en avant, où elle est trisériée; carènes discoïdales unisériées; marge des élytres bisériée, les cellules grandes et irrégulières; espace latéral bisérié, à cellules d'égale largeur. Long. 4—4,5, larg. 1,7—1,9 mm.

Gouvern. Taurique: Alechki (Алешки) (10. VI. 1901. Jatsentykovsky!).

Туловище снизу, голова, усики и бедра черного цвета, середина переднеспинки буроватая, вся же наружная сторона бледно-желтовато-серая. Голова с поверхностью мелко-зернистой и с обычными двумя парами желтоватых шипов; усики короткие, толстые, 3^я членик цилиндрический, толще прочих, покрыт мелкими бугорками и очень короткими прилегающими волосками. Переднеспинка с боковыми краями в два ряда клеток, впереди более расширенными, округленными, с тройным рядом клеток; шейный пузырь небольшой, узкий, сверху округленный, не закрывающий головы; три киля вдоль переднеспинки высокие, в один ряд клеток. Надкрылья с наружными краями листоватыми, в два ряда очень неправильных клеток черного цвета, клетки остальной части надкрылий буроватые; боковое поле в два ряда крупных клеток, одинаковой величины; дискоидальная площадка, с большими клетками только вдоль внешнего ребра, остальные же мелкие и более светлые. Срединная бороздка груди окраена с обеих сторон листоватыми киями, разделенными на клетки, почти такой же величины как и кили на переднеспинке. Голени буровато-рыжего цвета.

Новый вид примыкает непосредственно к *D. marmorea* Вэг, но крупнее и шире его; боковые края надкрылий нашего вида слегка вырезаны перед задним концом и в два ряда клеток; боковое поле также в два ряда крупных, одинаковой величины клеток, тогда как у *D. marmorea* наружное поле надкрылий в один ряд клеток, а боковое поле, хотя и в два ряда петель, но в одном ряду петли гораздо мельче, чем в другом.

Tuponia tincta, n. sp.

Dessus rosé, plus foncé au sommet du corium et à la base de l'écusson; dessous, antennes et pattes jaunâtres, très pâles, sans points ni taches plus obscurs; élytres couverts de poils blanchâtres couchés; ongles et yeux noirâtres. Tête convexe; pronotum d'un tiers plus large, en arrière, que la nuque (yeux compris); antennes longues, à 2^e article deux fois plus long que la largeur de la nuque; rostre ne dépassant pas les hanches postérieures, noirâtre au sommet; cuneus et membrane clairs, un peu enfumés, nervures de la membrane blanchâtres; tibias à cils longs, blancs.

Long. ♀ 3,5, larg. 1,6 mm.

Transcaspienne: Tedjène (A. Semenov!).

Из многочисленных представителей р. *Tuponia*, которых в одной фауне России считается до 14 видов, известен только один

съ шипиками на голеняхъ бѣлаго цвѣта — *T. pallida* Reut. изъ Туркестана; А. П. Семеновъ, во время своихъ путешествій по Закаспійскому краю, въ 1899 г., нашелъ по р. Теджену другой видъ, также съ бѣлыми, длинными, шиповатыми волосками, который значительно отличается отъ перваго и по цвѣту, и по пластическимъ признакамъ.

Верхняя сторона туловища розоваго цвѣта, при чемъ цвѣтъ этотъ гуще въ основаніи щитка и на концѣ согіум, гдѣ онъ образуетъ поперечную полосу; синеус и перепонка свѣтлыя, съ блѣдно-буроватымъ оттѣнкомъ; дискъ переднеспинки и голова въ передней части, при жизни, вѣроятно, бѣловатыя, у сухихъ же экземпляровъ — блѣдно-палеваго цвѣта, равно какъ и вся нижняя сторона туловища, только брюшко съ розоватымъ оттѣнкомъ; усики и ноги одноцвѣтные, блѣднаго буровато-желтаго цвѣта.

Голова съ крупными, черноватыми глазами; ширина затылка (вмѣстѣ съ глазами) гораздо меньше (0,7 mm.) ширины переднеспинки по ея заднему краю (1,1 mm.) и вдвое короче длины 2^{го} членика усиковъ (1,4 mm.); 3^й членикъ усиковъ почти одинаковой длины (1 mm.) съ шириною задняго края переднеспинки; хоботокъ достигаетъ до средней пары ногъ; надкрылья покрыты прилегающими желтовато-бѣлыми волосками, безъ стоячихъ щетинокъ; ноги одноцвѣтныя, безъ темныхъ точекъ или пятенъ, только когти черноватыя.

Замѣтка о родѣ *Vermipsylla* Schimk. и о сем. *Vermipsyllidae* Wagn. (Aphaniptera).

Проф. Ю. Вагнера (Кіевъ).

Родъ *Vermipsylla* былъ установленъ Шимкевичемъ по самкамъ *Vermipsylla alacurt* Schimk. въ 1884 году. Въ концѣ указанного года Шимкевичъ сдѣлалъ объ этомъ интересномъ видѣ докладъ въ засѣданіи Зоологическаго отд. Московскаго Общ. Любит. Естествознанія¹⁾. Дѣлая это сообщеніе, а также печатая свою замѣтку о *Vermipsylla alacurt* Schimk. въ слѣдующемъ году въ *Zoologischer Anzeiger* (VIII. Bd., p. 75), Шимкевичъ не подозрѣвалъ, что у *Vermipsylla alacurt* Schimk. есть уже описанный сородичъ. Точно также и я не только въ своей работѣ по анатоміи *Vermipsylla alacurt* Schimk., въ которой я выдѣлилъ этотъ родъ въ особое семейство *Vermipsyllidae*²⁾, но и позднѣе не думалъ, что описанный Taschenberg'омъ въ 1880 году *Pulex globiceps* Tsch.³⁾ ничего общаго съ родомъ *Pulex* не имѣетъ, а долженъ быть отнесенъ къ *Vermipsylla*. Правда, въ одной изъ своихъ работъ по *Aphaniptera* (1898), устанавливая точный діагнозъ рода *Pulex*, я замѣтилъ, что *Pulex globiceps* Tsch. не можетъ быть относимъ къ этому роду, но я тогда высказалъ ошибочное предположеніе, что *Pulex globiceps* Tsch. долженъ быть выдѣленъ въ особый родъ⁴⁾. Это мое предположеніе дало между прочимъ поводъ Kohaut'у въ недавно вышедшей его работѣ⁵⁾ предложить для *Pulex globiceps* Tsch. вмѣстѣ съ двумя новыми, близкими къ ней видами новый родъ: *Chaetopsylla*. Въ настоящее время, штудирова доступные мнѣ виды *Aphaniptera* для критической оцѣнки литературныхъ данныхъ, я замѣтилъ свою ошибку и пользуюсь случаемъ исправить ее.

1) Извѣст. Общ. Любит. Естествозн. и пр., Т. I, вып. 1, стр. 165.

2) См. *Horae Soc. Ent. Rossicae*, XXIII, 1889, p. 205.

3) Taschenberg, *Die Flöhe*. Halle, 1880, pp. 66—67.

4) *Horae Soc. Entom. Ross.*, XXXI, 1898, p. 576.

5) Kohaut, *Magyarország bolhái*. Allattani Közlemények, II köt., 1903, p. 37.