

noirâtres cerclées de rouge. Ventre et pattes d'un flave très pâle; cuisses avec un anneau subapical formé de points brunâtres; jambes brunâtres à l'extrémité.

Long. 6,5, larg. 4,2 mm.

Transcaspienne (E y l a n d t! 1891) (coll. S e m e n o v).

Коротко-овальная, широкая форма, по цвѣту и короткому, острому бугорку на второмъ брюшномъ кольцѣ напоминающая *M. 4-maculata* H o r v., но хорошо отличающаяся отъ нея нѣсколькими, указанными выше признаками. Особенно характерна форма головы, не встрѣчающаяся болѣе по крайней мѣрѣ у палеарктическихъ представителей р. *Menida*; именно, она сильно, почти вертикально загнута книзу, выпукла на затылкѣ и вдавлена въ передней половинѣ, съ отогнутыми кверху окраинами; носовой валикъ (tylus) ея плоскій, спереди замкнутый скуловыми отростками, которые широки и безъ выемки передъ глазами по наружному краю; глаза большіе, сильно развитые въ поперечномъ направленіи.

***Berytus nigrolineatus*, n. sp.**

Dessus d'un flavescient très pâle; crête céphalique en triangle allongé, horizontale sur sa tranche supérieure, densément hispide; antennes hérissées de longues soies dressées et blanchâtres, surtout sur le 1^{er} article; massue du 1^{er} article noire ainsi que l'article 2 et le 3^e à la base et au sommet. Pronotum à pilosité hérissée peu distincte, avec deux taches noires au milieu du bord postérieur; clavus hérissé de soies, avec des bandes longitudinales; membrane lancéolée, acuminée à l'extrémité. Massue des fémurs graduellement renflée, noire extérieurement et intérieurement.

Long. 9, larg. 1 mm.

Transcaucasie: Tiflis (C. S a t u n i n! 9. VII. 1902).

Туловище очень узкое, сверху блѣдно окрашенное, снизу нѣсколько темнѣе. Голова почти одинаковой длины съ переднеспинкой, головной отростокъ вытянутый, сверху горизонтальный (въ одной плоскости съ головой), снизу постепенно расширяющійся кзади, на вершинѣ пріостренный, покрытый сверху и снизу густыми бѣловатыми щетинками; задняя часть головы, такъ-же какъ и передняя треть переднеспинки, съ красноватымъ оттѣнкомъ; хоботокъ къ концу чернѣющій, первый членикъ его достигаетъ до задняго края глаза; усики едва длиннѣе $\frac{2}{3}$ туловища, покрытые очень длинными, бѣловатыми щетинками, болѣе густо расположенными на первомъ членикѣ, который равенъ длиною съ третьимъ и каждый въ отдѣльности равенъ длинѣ головы и переднеспинки взятыхъ вмѣстѣ; булава 1-го членика, кромѣ вершины, 2-й членикъ, кромѣ основанія, вершина и основаніе 3-го членика и весь 4-й—чернаго цвѣта; глаза свѣтло-бурые.

Переднеспинка сзади выпуклая, съ тремя сильными, продольными ребрами, изъ которыхъ среднее оканчивается назади тупо-

угольнымъ выступомъ надъ щиткомъ; поверхность ея грубо пунктирована и покрыта рѣдкими, короткими щетинками; по бокамъ средняго ребра, передъ концомъ его, замѣтно по черному пятну съ каждой стороны; щитокъ одноцвѣтный, съ очень развитымъ продольнымъ ребромъ посрединѣ.

Надкрылья узкія, очень длинныя, такъ что перепонка выступаетъ назади гораздо далѣе брюшка, съ боковыми краями едва округленными; вдоль *clavus*, между его среднимъ и внутреннимъ ребрами проходитъ черная полоса; такая-же полоса, но болѣе сильная, идетъ и между средними ребрами *corium*, узкая вершина котораго назади окрашена также въ черный цвѣтъ; мембранальный шовъ, въ видѣ тонкаго ребра, бураго цвѣта; ребра надкрылій сильныя, гладкія, всѣ же точки, выполняющія углубленія, носятъ довольно длинныя, полу-стоячія щетинки. Перепонка довольно узкая, на вершинѣ приостренная, съ своеобразными жилками; промежутки между ними съ бурыми полосами.

Ноги длинныя; бедра передней пары, вытянутыя впередъ, выступаютъ гораздо далѣе конца головы; булава бедръ длинная, постепенно утолщающаяся, съ внѣшней и съ внутренней стороны—чернаго цвѣта; такого-же цвѣта концы голеней и тарсовъ; передняя пара бедръ одѣта длинными щетинками; на остальныхъ ногахъ щетинки очень короткія, въ видѣ мельчайшихъ бѣловатыхъ зубчиковъ. Нижняя сторона туловища темнѣе верхней, съ боковыми краями впадающими въ красноватый оттѣнокъ; вдоль брюшка замѣтны двѣ пары темно-бурыхъ, узкихъ полосокъ.

Видъ этотъ относится къ небольшой группѣ формъ, у которыхъ усики одѣты длинными щетинками и стоитъ ближе всего къ *B. setipennis* Saund., подобно которому имѣетъ надкрылья покрытыя полустоячими щетинками, отличаясь отъ него нѣсколькими существенными признаками; такъ, головной отростокъ нашего вида не округленный, какъ у *B. setipennis*, а заостренный, задній край переднеспинки почти прямой, усики и ноги не одноцвѣтныя, а имѣютъ булавы окрашенныя въ черный цвѣтъ; наконецъ, вдоль надкрылій проходятъ рѣзкія, черныя полосы; такой окраски вообще не замѣчалось, до сихъ поръ, у палеарктическихъ видовъ р. *Berytus*.

Замѣтка о видахъ рода *Carabus* (L.), составляющихъ подродъ *Alipaster* R t t r. (Coleoptera, Carabidae).

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

Шесть лѣтъ тому назадъ, не имѣя въ своемъ распоряженіи ни одного представителя названнаго въ заглавіи подрода, я высказалъ предположеніе о принадлежности его, вмѣстѣ съ подродомъ *Cratocarabus* R t t r., къ ряду *Carabi megalodontogenici*¹⁾. Однако теперь, когда я имѣю передъ глазами *Carabus (Alipaster) pupulus* A. M o r., мнѣ кажется болѣе правильнымъ отнести подродъ *Alipaster* R t t r., такъ-же, какъ, вѣроятно, и *Cratocarabus* R t t r., къ ряду *Carabi ceche-nogenici* (sens. nostro 1898). Долженъ признаться, впрочемъ, что границы между этими двумя рядами группъ рода *Carabus* (L.) еще далеко не выяснились окончательно.

Къ подроду *Alipaster*, въ которомъ R e i t t e r указываетъ лишь одинъ видъ²⁾, принадлежатъ на самомъ дѣлѣ слѣдующіе 3 вида, свойственные исключительно горной системѣ восточнаго Тянь-шаня.

1. *Carabus (Alipaster) infantulus* A. M o r. 1886.

Carabus (Cratocephalus) infantulus A. M o r a w i t z, Zur Kenntn. d. Adephag. Col. (Mém. Acad. Imp. Sc. St.-Petersb., VII sér., XXXIV, № 9), 1886, p. 73.

Видъ этотъ извѣстенъ, насколько я знаю, пока лишь по единственному экземпляру, происходящему изъ еловыхъ³⁾ лѣсовъ долины р. Цанмы, лѣваго притока Кунгеса въ с.-в. Тянь-шанѣ, къ ВЮВ отъ Кульчи (съ абс. выс. ок. 6.000') (эксп. Н. М. П р ж е в а л ь с к а г о 1876) (Зоол. Муз. Имп. Акад. Наукъ).

1) A. S e m e n o v: Horae Soc. Ent. Ross., XXXI. 1898, p. 432, nota 96, p. 507.

2) R e i t t e r, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XXXIV: *Carabidae*, 1. Abth.: *Carabini* (Verh. naturf. Ver. Brünn, XXXIV), 1896, p. 77.

3) *Picea schrenckiana* F i s c h. & M e y.