

Pyrrhia exprimens Walker = *vexilliger* Chr. = *aconiti* Hölzermann въ палеарктической области (Lepidoptera, Noctuidae).

С. С. Четверикова (Москва).

Въ недавно появившемся четвертомъ выпускѣ Bulletin de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou за 1902 г., стр. 587—588, помѣщена небольшая замѣтка покойнаго Fr. Hölzermann'a „*Pyrrhia aconiti*, n. sp. in der Umgegend von Perm in Russland“, въ которой онъ описываетъ найденную имъ въ Пермской губ. ночницу изъ рода *Pyrrhia* (*P. aconiti* Hltzrm.), при чемъ къ статьѣ приложена раскрашенная таблица (XVII), изображающая эту ночницу, ея гусеницу и другую ночницу, близкую къ первой (*P. umbra* Hufn.). Изъ статьи видно, что указанная бабочка посылалась авторомъ для просмотра покойному Staudinger'у, и что тотъ призналъ ее за *новый*, до сихъ поръ никѣмъ не описанный видъ.

Благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ, я имѣлъ возможность познакомиться съ этой интересной формой не по тѣмъ рисункамъ, которыми сопровождается статья Hölzermann'a, — рисункамъ не вполне удачнымъ, — а по самимъ оригиналамъ, съ которыхъ дѣлались эти рисунки¹⁾.

Кромѣ того я былъ настолько счастливъ, что получилъ въ свое распоряженіе одинъ экземпляръ указаннаго вида, взятый въ Маринской тайгѣ (Томская губ., Маринскій у.) С. П. Ордынскимъ. На основаніи этихъ данныхъ я могу съ полной достовѣрностью сказать, что описанная Hölzermann'омъ новая ночница, *Pyrrhia aconiti* Hltzrm., на самомъ дѣлѣ давно уже извѣстна изъ Сѣверной Америки подъ названіемъ *Pyrrhia exprimens* Walker (*angulata* Grote). Я тщательно сличилъ Hölzermann'овскіе типы съ имѣющимися въ Академической коллекціи экземплярами *P. exprimens* Walker изъ Орегона и могу положительно сказать, что не нашелъ никакихъ признаковъ, отличающихъ европейскую форму отъ американской и достаточныхъ для того, чтобы выдѣлить первую въ само-

1) Долженъ замѣтить, что литографія Fupke въ Лейпцигѣ, которая печатала эту таблицу, передала насколько только возможно точно оригинальные рисунки Hölzermann'a, которые, однако, совершенно не даютъ понятія объ общемъ видѣ (habitus) описываемой формы и вообще грубоваты.

стоятельный варіететъ. Далѣе оказалось, что указанная форма была уже и ранѣе найдена въ палеарктической области покойнымъ Christoph'омъ, подъ Красноярскомъ, и описана имъ подъ названіемъ *Chariclea vexilliger* Chr. ²⁾.

Такимъ образомъ центръ тяжести открытія H ö l t z e r m a n n'a переносится совсѣмъ не туда, гдѣ его искалъ покойный авторъ. Видъ этотъ не новый, но нахождение его въ палеарктической области является фактомъ неизмѣримо болѣе интереснымъ и важнымъ, чѣмъ простое нахождение новой формы. Если мы припомнимъ, что и другой видъ (*P. umbra* H u f n.) распространенъ такъ-же широко въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ, то указанный фактъ получаетъ еще большее значеніе. Это даетъ уже намъ извѣстное право разсматривать весь родъ *Pyrrhia* какъ арктическій, возникшій и расселившійся еще задолго до нашихъ дней, въ то время, когда связь между Неарктикой и Палеарктикой была несравненно тѣснѣе, чѣмъ теперь. Въ то-же время это указываетъ на то, что виды рода *Pyrrhia* обладаютъ значительной устойчивостью, такъ что два вида его сохранились въ обѣихъ областяхъ, не разойдясь даже въ своихъ признакахъ настолько, чтобы образовать мѣстные разновидности.

Но кромѣ этихъ выводовъ наблюденія H ö l t z e r m a n n'a даютъ еще отвѣтъ на вопросъ, является ли *P. exprimens* Walker лишь варіететомъ *P. umbra* H u f n., какъ ее теперь принято считать въ Америкѣ, или же самостоятельнымъ видомъ. Многолѣтнія и тщательныя наблюденія покойнаго автора не оставляютъ, повидимому, ни слѣда сомнѣнія въ томъ, что обѣ указанныя формы (*P. exprimens* Walker и *P. umbra* H u f n.) являются вполне самостоятельными, хотя и близкими, видами; съ этой точки зрѣнія можно дѣйствительно сказать, что H ö l t z e r m a n n'у удалось найти новый „видъ“.

Что касается распространенія *P. exprimens* Walker въ палеарктической области, то къ сообщеннымъ фактамъ могу добавить еще, что въ коллекціи бабочекъ покойнаго А л ь б р е х т а, недавно приобрѣтенной Коммиссіей для изслѣдованія фауны Московской губ., состоящей при Имп. Обществѣ Любит. Естествозн., Антроп. и Геогр., находится одинъ экземпляръ (облетавшійся) этого вида, пойманный въ предѣлахъ Московской губ.

Такимъ образомъ оказывается, что указанный видъ захватываетъ довольно обширную территорію, простирающуюся отъ центральной Россіи черезъ ея сѣверо-востокъ до восточныхъ границъ западной Сибири. Но для меня почти не подлежитъ сомнѣнію, что при болѣе тщательномъ изслѣдованіи Сибири, особенно ея сѣверныхъ частей, эта форма будетъ найдена и далѣе на востокъ, можетъ быть до самаго Великаго океана, и тѣмъ прямо дастъ новое указаніе на то, гдѣ именно была та нарушившаяся связь, которая прежде соединяла двѣ обширныя арктическія области.

2) Deutsch. Ent. Zeitschr. Iris, VI, 1893, p. 92.