

## Description d'une nouvelle *Sphenoptera* (Coleoptera, Buprestidae) de la Transcaucasie.

Par

B. E. Jakovleff (Eupatoria).

---

### *Sphenoptera oporina*, n. sp.

Ovalaire, allongé, atténué aux deux extrémités, assez convexe, noir, avec un faible reflet bronzé obscur; dessous bordé de duvet jaunâtre.

Tête large, convexe, avec une fine ligne longitudinale au milieu, très finement et vaguement ponctuée, la ponctuation un peu plus serrée en avant; front légèrement impressionné, avec deux reliefs à peine sensibles, légèrement cuivreux en avant; épistome petit, noir, échancré en arc; yeux grands, convexes; côtés internes des scrobes antennaires presque plans; antennes courtes, noires, minces, à 3<sup>e</sup> article d'un tiers plus long que le 2<sup>e</sup>, qui est presque égal au 4<sup>e</sup>.

Pronotum transverse, d'un tiers plus large que long, subparallèle, rétréci en avant, finement rebordé sur les côtés jusqu'aux  $\frac{3}{4}$ ; le rebord droit, à peine courbé à la base; angles postérieurs aigus, dépassant les élytres; surface très finement pointillée et assez densément et presque également ponctuée; bord antérieur entièrement marginé; sillon médian à peine sensible, parfois avec une fovéole antéscutellaire, peu distincte. Ecusson cordiforme, terminé en forte pointe aiguë.

Elytres un peu plus larges, à la base (entre les bosses humérales), que le pronotum et 3 fois aussi longs, rebordés sur les côtés jusqu'aux  $\frac{4}{5}$ , largement sinués au pli crural, atténués et conjointement arrondis au bout, finement et également ponctués, sans stries distinctes; chez les ♂♂ les stries 6 et 7 sont enfoncées au milieu et formées de points plus grands et plus profonds; région scutellaire plane en avant, impressionnée le long de la suture, en arrière; suture carénée postérieurement; bosse humérale assez saillante; la dorsale large, mais moins convexe.

Menton en arc. Prosternum plan, finement et peu densément ponctué, avec quelques points formant comme une strie marginale de chaque côté; mésosternum légèrement sillonné, presque canaliculé chez le ♂. Hanches postérieures dilatées en dedans, échancrées aux épimères.

res; abdomen sillonné sur le 1<sup>er</sup> segment, finement ponctué, comme strié à la base, avec une faible bordure latérale de poils jaunâtres. Pattes assez épaisses, tarsi postérieurs assez longs, à 1<sup>er</sup> article plus long que le 5<sup>e</sup>.

♂. Jambes antérieures et intermédiaires arquées.

♂. Long. 8,2—9,3 mm., larg. 3,2—3,7 mm.

♀. Long. 8—9,5 mm., larg. 2,7—3,8 mm.

*Transcaucasie*: Elisabethpol (Д. Malushenko! 25. XI. 1902).

Cette petite espèce, dont je dois 2 ♂ et 4 ♀ à l'obligeance de M. E. Koenig, appartient au groupe de *Sph. glabrata* et diffère de ses voisines par certaines particularités mentionnées ci-dessus et qui permettent de la considérer comme bien distincte. Il est à noter, que tous les spécimens ont été capturés tard en automne et il se peut qu'à une saison moins avancée on en trouve d'autres, colorés avec plus d'éclat.