

brevi, summo margine tenuissimo. A *Chrysidibus*: *aeratâ* Dahlb. *refulgente* Spin. et affinibus differt imprimis praeter colorem capitis thoracisque postscutello acute conico, superne aspero.

Chrysis fax, sp. n.

♀. *Tetrachrysis* (sensu Mocsáry 1889); quoad dispositionem colorum habitumque solum *Chr. scutellari* F. similis, sed abdominis segmento dorsali 3^o toto cum margine apicali igneo-aurato, scutello et toto postscutello cum scutello metathoracis laetius subigneo-auratis, mesonotilobis lateralibus ex parte subauratis, pronoto magis viridi; medio laetius et saturatius aurato (semperne?), etiam cavitate faciali laetius viridicoeruleâ, ventris segmentis basalibus viridi-auratis, 1^o nigro-variegato, 2^o maculis duabus nigris fere $\frac{2}{3}$ segmenti occupantibus signato, 3^o nigro maculâ sat magnâ subbasali viridicoeruleâ decorato; antennarum omnibus articulis paulo longioribus, 3^o longitudinem sequentium duorum unitorum fere exacte adaequante; capite multo latiore, cavitate faciali latâ supra carinulâ manifestâ sursum biangulatâ terminatâ, genis longioribus, angustis, longitudinem 2ⁱ antennarum articuli manifestissime superante, fronte et vertice longius griseo-pilosis; pronoto latiore et brevioris, grossius, vadosius subreticulatimque punctato, margine postico latius magisque arcuatim exciso; mesonoto minus profunde quoque grossiusque punctato; scutello et postscutello multo grossius et vadosius reticulato-punctatis; mesopleuris sulco longitudinali minus expresso, minus profundo; angulis postico-lateralibus metathoracis aliter formatis: subtriangularibus, majoribus, apice acuminato nonnihil extrorsum porrecto, latere extero subsinuato; abdomine similiter atque in *Chr. ignitâ* L. formato, sculpto et colorato, medio longitudinaliter manifestissime carinulato, lateribus magis parallelo, ad latera longius canescenti-piloso, segmento 1^o sat grosse, vadosae remoteque punctato, inter puncta parce punctulato, 2^o subtiliter sat laxè punctato et punctulato, 3^o magis elongato, crebre subtiliterque subaciculato-punctato, medio transversim subdepresso, ad apicem magis longiusque angustato, supra seriem anteapicalem manifeste calloso, hac utrinque fere ad basin segmenti usque continuatâ, circ. 16 (8+8) foveolas majusculas inter, se partim confluentes continente, margine apicali longo, acute 4-dentato, dentibus longis, imprimis exterioribus, his ab internis magis quam intermediis inter se distantibus, emarginaturis exterioribus profundis, mediâ minus profundâ sed regulariter quoque arcuatâ; segmentis ventralibus subtilissime punctulato-coriaceis, praeterea non punctatis; femoribus anticis parum neque profunde punctatis; alis anticis cellulâ radiâli valde elongatâ sec. marginem costalem manifeste fumigatâ.

♂ nondum notus.

Long. ♀ 9 mm.

Prov. Heptapotamica (Semiretshje): ad fl. Barskaun, qui in lacum Issyk-kul influit (exped. prof. B. Saposhnikov! 6. VI. 1902).—Solum specimen (♀) (coll. P. Semenov).

Solummodo *Chr. ignitae* L. proxime affinis; a qua discrepat praeter colorem laetorem pronoti (majore ex parte aurati), igneo-vel subigneo-auratum scutelli, postscutelli et scutelli metathoracis, saturate cyaneum reliquae partis metathoracis, lobi mediani mesothoracis tegularumque, praesertim angulis postico-lateralibus metathoracis multo acutioribus, extrinsecus haud truncatis, subsinuatis, apice valde acuminato haud retrorsum sed manifeste extrorsum directo; abdominis 3^o segmento dorsali ad apicem magis adeo sensimque angustato, margine apicali angustiore (etsi non brevior), dentibus intermediis inter se sinu minus profundo separatis, thorace majore ex parte reticulato-punctato, pronoto paulo minus brevi angulis anticis minus rectis apiceque obtusioribus, oculis minus convexis et prominulis (praesertim aspectu a fronte), genis minus pilosis.

***Pseudochrysis sphinx* S e m. 1902.**

Pseudochrysis sphinx A. S e m e n o v: Revue Russe d'Entom., II, 1902, p. 168 (♂ ♀).

Habitat etiam ad lacum Balchash: insula Urt-aral in parte hujus lacus occidentali (exped. L. B e r g! 22. VIII. 1903: 9 specimina ♂ ♀).

Specimina balchashana differunt ab aralensibus solummodo thorace maximâ ex parte minus viridi, magis rosaceo- s. purpurascenti-cupreo, dentibus marginalibus 3^{ti} segmenti dorsalis abdominis nonnunquam minus aequalibus, inter se hic-illic copulatis; long. 6,5 (♂) — 9,2 (♀) mm.

О новыхъ для русской фауны жесткокрылыхъ.

Андрея Семанова (С.-Петербургъ).

IV *).

16. *Syrdenus grayi* (Woll. 1862) [= *Pogonus fulvus* Baudi 1864 = *Syrdenus extensus* Chaud. 1871 = *S. dilutus* Fairm. 1873] былъ послѣднее время указываемъ лишь для сѣверной полосы Африки (начиная съ о-вовъ Зеленаго Мыса и наиболѣе восточнаго изъ Канарскихъ, черезъ Марокко, Алжирію, Тунисъ до нижняго Египта), а также для Сициліи и Кипра (ср. Bedel, Cat. rais. Col. N. Afr., I, 1897, p. 90). Между тѣмъ видъ этотъ распространенъ въ восточномъ на- правленіи до Бомбея въ с.-з. Индіи, что было отмѣчено еще Chaudoir'омъ (Bull. Soc. Nat. Mosc. 1878, II, p. 80), но ускользнуло отъ вниманія Bedel'я. Оказывается, что *Syrdenus grayi* входитъ въ составъ и русской фауны: я имѣю его съ восточн. побережья Каспія изъ Чикишляра (И. Д. Померанцевъ!) и изъ Узун-ада (П. А. Варенцовъ! 15. IV и 13. V. 1895); кромѣ того, благодаря любезности Р. Г. Шмидта, я имѣлъ передъ глазами экземпляръ этого вида, пойманный имъ на свѣтъ электрической дуговой лампы въ имѣніи А. Б. Шелковникова Геокъ-тапа, Арешк. у. Елисаветпольск. губ., 20. VII. 1901. Послѣднее мѣстонахожденіе особенно интересно, такъ какъ видъ этотъ придерживается главнымъ образомъ морскихъ побережій, встрѣчаясь, однако, и по берегамъ соляныхъ озеръ (ср. Bedel, l. c.). Приводя замѣчательный случай нахожденія *Pogonus luridipennis* Germ. въ Рязанской губерніи, я, впрочемъ, уже указывалъ на способность представителей группы *Pogonidae*, являющихся типичными галофилами, переноситься на большія разстоянія ¹⁾).

17. Интересная находка сдѣлана недавно Н. Н. Зубовскимъ: 3—5. VI. 1901 ему попался въ окрестностяхъ Кишинева новый для

*) См. Русск. Энт. Обзор., II, 1902, стр. 236—238.

¹⁾ См. А. Семановъ: Bull. Soc. Nat. Mosc. 1898, № 1, p. 77. Совершенно аналогичное наблюденіе надъ тѣмъ-же *Pogonus luridipennis* Germ. было сдѣлано въ свое время и бар. Шодуаромъ въ Волынской губ. (ср. Chaudoir, Monogr. des Pogonides, in Ann. Soc. Ent. Belg., XIV, 1871, p. 22).