

русской фауны *Ditomus clypeatus* Rossi 1790, видъ, до сихъ поръ считавшійся характернымъ для юго-запада Европы ²⁾ и извѣстный только изъ Испаніи, Франціи (однако до Парижа въ сѣверномъ направленіи), Балеарскихъ о-вовъ, Италіи съ Корсикой, Сардиніей и Сициліей, изъ Марокко, Алжиріи и Туниса, Далмаціи, южной Венгріи ³⁾ и Іонійскихъ о-вовъ, считавшихся крайнимъ пунктомъ распространенія этого вида на В. Въ колл. П. П. Семенова имѣется, кромѣ того, экземпляръ этого вида заграничнаго происхожденія съ этикеткой „Румынія“. Какъ этотъ экземпляръ, такъ и экземпляръ найденный Н. Н. Зубовскимъ характеризуются равномерной, обильной и сильной пунктировкой всѣхъ промежутковъ на надкрыльяхъ, что у западно-европейскихъ особей, какъ извѣстно, наблюдается нечасто.

18. Говоря въ своей превосходной ревизіи палеарктическихъ *Bostrychid'* о *Schistoceros bimaculatus* (Oliv. 1790) (*auritus* Friv. 1835), P. Lesne ⁴⁾ называетъ его „espèce exclusivement méditerranéenne, paraissant peu répandue dans le nord de l'Afrique“. Просматривая обстоятельный перечень извѣстныхъ мѣстонахожденій этого вида у названнаго автора ⁵⁾, мы встрѣчаемъ только одно указаніе о нахожденіи его въ Россіи: онъ показанъ былъ, именно, Зоуфалемъ ⁶⁾ изъ Туркестана. Показаніе это, не документированное точными данными и никѣмъ не подтвержденное, мы считаемъ весьма сомнительнымъ, такъ какъ оно не гармонируетъ съ характеромъ распространенія вида: онъ занимаетъ, въ общемъ, непрерывную область, охватывающую, начиная съ Португаліи, все сѣверное побережье Средиземнаго моря, отчасти также южное (Алжирія), и въ восточномъ направленіи не идетъ, повидимому, далѣе Сиріи.

Поэтому особенно интереснымъ и характернымъ намъ кажется нахожденіе *Schistoceros bimaculatus* Ol. въ Крыму, гдѣ онъ встрѣченъ Н. Я. Кузнецовымъ 15. V. 1903 въ Артекѣ, бл. Гурзуфа, на виноградѣ (4 экз.: 3 ♂, 1 ♀). Только послѣ находки Н. Я. Кузнецова видъ этотъ можетъ быть занесенъ въ списки русской фауны. Развивается онъ, по Lesn'у, не только на виноградѣ, но также на гребенщикѣ (*Tamarix*) (Peggis, Reu и др.) и на *Lycium* (Hambeu). Imago встрѣчается, повидимому, только весной.

19. Чисто-средиземноморская *Zonitis immaculata* (Oliv. 1789), извѣстная до сихъ поръ только изъ Испаніи, Италіи, Греціи и Малой

²⁾ Cp. Piochard de la Brûlerie, Monogr. der Ditomides (L'Abeille, XI), 1873, pp. 18—20; Ganglbauer, Käf. v. Mitteleur., I, 1892, p. 338; Bedel, Cat. rais. Col. N. Afr., I, 1897, p. 120; Reitter, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XLI (Verh. naturf. Ver. Brünn, XXXVIII), 1900, p. 45.

³⁾ Cp. Kuthy, Fauna Regni Hungar., Insecta Coleopt., 1896, p. 36.

⁴⁾ L'Abeille, XXX, 1901, p. 93.

⁵⁾ L. c.; также въ Ann. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 522.

⁶⁾ Zoufal: Wien. Ent. Zeitg. 1894, p. 41.