

В. Лучник.

Новый вид рода *Ditomus* Bon. (Coleoptera, Carabidae).

V. Lutshnik.

De nova specie generis *Ditomus* Bon. (Coleoptera, Carabidae).

*Ditomus tanaiticus*, sp. n.

*D. dypeato* Rossi simillimus, sed oculis paulo minus convexis, capite fortiter punctato, foveolis frontalibus indistinctis, prothorace fortiter punctato, angulis apicalibus magis prominulis, elytrorum interstitiis crebre, biseriatim punctatis distinguendus. Long. 11, 5—12, 5 mm.

Rossia meridionalis: Rostov.

Черный, сильно блестящий; усики, щупальца и ноги красно-бурые, с более темными бедрами. Сверху голова в более коротких и редких, переднеспинка и надкрылья в очень частых и длинных волосках. Голова большая, широкая, со слабо выступающими глазами, вся в крупных, частых, впереди сливающихся точках, на наличнике с рядом грубых продольных морщин; лобные вдавления слабые, едва заметные; усики очень длинные, значительно заходящие за основание переднеспинки. Переднеспинка сильно поперечная, в ширину более чем вдвое больше своей длины, шире чем голова с глазами, с сильно и равномерно вырезанным передним краем и очень выступающими вперед и сильно заостренными на вершине передними углами, с боков округленная, имеющая наибольшую ширину в первой трети, в основании сильно суживающаяся, назади параллельносторонняя, с прямыми, на вершине несколько округленными задними углами; боковые края с каемкой назади, сглаживающейся и не достигающей основания, вся в крупных и частых назади сливающихся точках; срединная линия нежная, не достигающая ни переднего, ни заднего края. Надкрылья уже переднеспинки, почти параллельные, несколько расширенные позади середины, с глубокими точечными бороздками и выпуклыми промежутками, покрытыми очень крупными, тесно стоящими точками, расположенными на каждом проме-

жутые большею частью в два неправильных продольных ряда. Снизу голова, передне- и среднегрудь в очень крупных, заднегрудь и брюшко в более мелких точках. Длина 11,5—12,5 мм.

Ростов на Дону, V. 1913, В. Н. Лучник; 10. V. 1918, Д. П. Довнар-Запольский. Два экземпляра в моей коллекции.

Несмотря на сильно развитую пунктировку, этот вид наиболее близок к *D. clypeatus* Rossi, с которым он сходен общим обликом, а также укороченной боковой каемкой переднеспинки. Наиболее *D. tanaiticus* отличается от *D. clypeatus* более крупной и частой пунктировкой головы, едва явственными лобными вдавлениями, менее выпуклыми глазами, сильнее пунктированной переднеспинкой, передние углы которой более выступают и имеют сильнее заостренную вершину, сплошь крупно пунктированными надкрыльями, бороздки которых более глубоки, а промежутки сильнее выпуклы. В литературе, повидимому, именно этот вид был указан В. А. Кизерицким из Новочеркасска, как *Ditomus* sp. (Русск. Энтом. Обзор., XII, 1912, стр. 84).

---