

**С. И. Медведев.**

**Новый вид сверчка, живущий в норах суслика в Припонттийских степях  
(Orthoptera).**

(С 4 рис.).

---

**S. I. Medvedev.**

**De nova Gryllidarum specie in latibulis Citellorum in tesquis Ponticis vivente  
(Orthoptera).**

(Cum 4 fig.).

---

***Gryllomorpha miramae*, sp. n.**

Minuscula, corpore subparallelo, solo abdomine plus minusve dilatato (fig. 1). Sordide diluteque lurida, fusco-maculosa, opaca, pallida, subtiliterque tomentosa et nigro-setosa. Caput pronoto aequilatum, vix nisi nitidum, fronte et quatuor maculis parvis occipitis fuscis, linea longitudinali media, antice furcata pallida; parte antica frontis eminentia antennarum articulo basali paulo latiore. Pronotum margine antico angusto fere nigro, ciliato, disco dimidio posteriore fascia lata, medio late interrupta fusca ornato. Mesonotum sat breve, fuscum, solum linea longitudinali media late pallida. Metanotum longius, fuscum, postice late pallidum. Elytra nulla. Abdomen tergito primo majore ex parte fusco, solum limbo postice pallido, tergitis quinque sequentibus pallidis, solum medio dorsi late et macula haud magna utrinque fuscis. Pedes pallidi, maculis minus determinatis fuscescentibus ornatis; tibiis intermediis 4-calcaratis, posticis spina seriei externae ultima calcari insequente brevior.

♂. Tergito dorsali nono margine postico rotundato. Lamina supra-analis (fig. 2) parte basali plana, postice impressa profunde lateque emarginata, utrinque lobum subtriangularem formante; lamina subgenitali laminam supraanalem multo superante, longe producta, subcompressocucullata, utrinque late reflexa, lobis ad angulum apicalem contiguis.

♀. Lamina supraanali (fig. 3) oblongato-triangulari, angulo apicali acuto, summa tantum apice subrotundato, lateribus ante basin breviter sed valde sinuatis, dorso medio impressa; ovipositore fere recto, vix

deorsum curvato, cercis paulo longiore. Lamina subgenitali (fig. 4) sat parva, triangulari, apice late truncata et medio subangulatim excisa.

♂ long. corp. 7,4—7,6 mm., long. pronoti 1,4 mm., long. fem. post. 5,2 mm.; ♀ long. corp. 8,2—9,6 mm., long. pronoti 1,6—1,8 mm., long. ovipos. 55,5 mm., long. fem. post. 5—5,5 mm.

Solum *Gr. uclensi* Pant. proxima similisque, a qua discedit superficie nonnihil aliter picturata, lamina supraanali ♂ aliter constructa,




Рис. 1, 2, 3 и 4.

lamina subgenitali ♂ multo magis producta, lamina supraanali ♀ longiore, apice non retusa, aliter configurata, lamina subgenitali ♀ apice magis determinate excisa, ovipositore manifeste brevior.

Rossia europaea meridionalis: tesqua prope Ascaniam-Novam, districtus Melitopolensis, in latibulis *Citellorum* (ipse, 3—4.IX.1930). 6 specimina (2♂, 4♀); typi in Museo Zoologico Acad. Sc. Ross.

Описываемый новый вид ближе всего стоит к *Gryllomorpha uclensis* Pant. из Испании и Португалии. От последнего он хорошо отличается