

V. V. Barovskij.

Un *Trixagus* Kug. (*Throscus* Latr.) nouveau de la région d'Ussuri
(Coleoptera, *Trixagidae*).

B. B. Варовский.

Новый вид *Trixagus* из Уссурийского края (Coleoptera, *Trixagidae*).

Trixagus major, sp. n.

Major, piceo-niger, pronoti angulis posticis antennisque apice brunnescentibus (semperne?), tarsis brunneis exceptis, aureolo-pilosus.

Capite minutissime alutaceo sed nitido punctisque umbilicatis, raro positis (interspatiis punctorum, quam puncta ipsa majoribus), pilis aureolis obsito, oculis mediocribus, integris, non divisis. Pronoto transverso, convexo, ante marginem basalem nonnihil depresso et medio (basi) longitudinaliter vix convexo, minutissime alutaceo et punctis umbilicatis raro positis obsito pilisque aureolis accumbentibus diverse directis oblecto. Scutello sat magno, triangulari, apice arcuato, minutissime alutaceo punctatoque. Elytris elongatis, subparallelis, sat profunde striatis, striis sat profunde punctatis, interstitiis striarum seriebus punctorum umbilicatorum obsitis, striis lateralibus magis, profundius punctatis, pilis aureolis duplicibus brevibus longioribusque oblectis. Subtus minutissime sparseque punctatus punctisque umbilicatis raro positis obsitis et pilis aureolis brevibus tenuissimis accumbentibus ac sat longis erectis oblectus; pedibus fusco-brunneis. Long. 3,8—4, lat. 1,5 mm.

Prov. Austro-Ussuriensis: Jakovlevka, distr. Spassk, 15. V. 1926 (A. Djakonov); fl. Amur, cursus superior, Tolbusino, VI--VII. 1929 (V. Prinada); prov. Jakutsk, via Verchojanskaja, fl. Tumara, 6. VIII. 1899 (Charitonov); Transbaikalia, Ingoda, vallis Argalej, 15. VI. 1898 (G. Suvorov); distr. Irkutsk, Padun, 28. V. 1868 (A. Tshekanovskij); Vjatka, 30. VII. 1910. Typus in coll. Mus. Zool.

Dans le tableau synoptique de M. Edm. Reitter¹⁾ cette espèce doit être placée près de *T. latior* Pic²⁾ qui m'est inconnu en nature; mais notre espèce a la tête non élevée au milieu, le prothorax marqué de chaque côté de la base d'une très faible impression, les élytres non progressivement atténuées vers l'arrière; le dessous de corps entièrement noir de poix, ainsi que la tête, mais les derniers articles des antennes et les tarses sont roussâtres; l'espèce diffère de *T. niger* Geb.³⁾ par sa tête non carénée.

РЕЗЮМЕ.

Описывается новый вид рода *Trixagus* Kug., *T. major*, из Уссурийского края, откуда до настоящего времени не было известно представителей этого рода. sp. n. отличается от прочих видов рода, прежде всего, темной окраской и большей величиной тела.

¹⁾ Wien. Ent. Ztg. XXXVIII, 1921 p. 66 et 67. ²⁾ L'Échange 1908, № 282, p. 42.

³⁾ Gebler, F. Ledebour's Reise, II Theil, Berlin 1829, Catalogus