


Д. С. Шапиро

НОВЫЙ ВИД ЗЕМЛЯНОЙ БЛОШКИ (COLEOPTERA,
CHRYSOMELIDAE) ИЗ КАЗАХСТАНА(D. S. SHAPIRO. A NEW FLEA-BEETLE (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) FROM
KAZAKHSTAN)*Phyllotreta parfentjevi* Shapiro, sp. n. (см. рисунок).

Тело уплощенное, продолговатое, довольно узкое, блестящее. Черный, с широкой желтой полосой на каждом надкрылье. Полосы по краям с размытыми контурами; хорошо видны поперечные более темные участки за серединой надкрыльев, вследствие чего они кажутся разорванными.



Усики длинные, доходят до половины тела и покрыты короткими волосками, к вершине, начиная с 6-го членика, зачерненные, их первый членик наиболее длинный, последний заостренный; голени и лапки желтые, бедра черные и лишь в местах сочленения с голеньями желтые; нередко встречаются экземпляры с более светлыми бедрами. Лобные бугорки неотчетливые, лобный киль плоский с продольным нерезким желобком посредине; темя чуть выпуклое. Переднеспинка поперечная, более широкая посредине, уже надкрыльев, кпереди и кзади заметно сужена, бока закругленные с притупленными передними и задними углами; щиток маленький с закругленной вершиной; надкрылья почти параллельносторонние, на вершине прямо обрублены и не прикрывают конца брюшка, имеющего форму треугольника; шовные углы широко закруглены порознь.

Пунктировка темени, лба и переднеспинки мелкая и густая, на надкрыльях более крупная; промежутки между точками шагреневые.

Низ тела шагреневый, покрыт очень редкими короткими волосками; голени и лапки более густо покрыты волосками; наружный край голеней с немного загнутым зубом. Длина 2—2.2 мм. ♀ несколько шире ♂.

Ph. parfentjevi Shapiro, sp. n. (Рис.
С. И. Медведева).

Габитуально вид этот более близок к *Phyllotreta turcmenica schreineri* Jacobs.,

но хорошо отличается свободным пигидием и формой последнего, а также другими признаками.

Блошка эта была обнаружена В. Я. Парфентьевым в Казахстане в саксаульниках долины р. Или в Алма-Атинской обл. Жуки и личинки были обнаружены 16 июля 1952 г. Встречается данный вид повсеместно в массе на черном саксауле в южном Прибалхашье. Личинка живет в ассимилирующей зеленой веточке саксаула (по наблюдениям В. Я. Парфентьева).

Питание описываемого вида на саксауле (сем. Chaenopodiaceae) расширяет имеющиеся сведения о кормовых связях представителей рода *Phyllotreta* Foudr. До этого была известна приуроченность видов данного рода к растениям из семейств Cruciferae (*Ph. nemorum* Rdt., *Ph. undulata* Kutsch., *Ph. vittata* F. и др.), Resedaceae (*Ph. procera* Rdt., *Ph. nodicornis* Marsh.) и Gramineae (*Ph. vittula* Rdt.).

Известно также, что развитие личинок *Phyllotreta* происходит в почве, лишь личинка *Ph. nemorum* развивается на листьях крестоцветных растений. Следовательно, саксаульная блошка является вторым видом, личинка которого развивается в надземных частях растения.

Голотип находится в коллекции Зоологического института Академии наук СССР.

Кафедра энтомологии
Харьковского государственного университета,
г. Харьков.
