

М. Е. Тер-Минасян

НОВЫЕ ВИДЫ РОДА *LARINUS* GERM. (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) ИЗ ЗАКАВКАЗЬЯ[M. E. TER-MINASSIAN. NEW SPECIES OF THE GENUS *LARINUS* GERM. (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) FROM TRANSCAUCASIA]

При обработке небольшого материала из Азербайджана и Армении были обнаружены 15 видов рода *Larinus* Germ., два из них оказались новыми для науки. Их описание дано в настоящей статье.

Типы новых видов находятся в коллекции Зоологического института Академии наук СССР.

Larinus jaceae F.

Армения: Кавушуг, Ехегнадзорский район, 13 VII 1959 (В. Рихтер). Бюракан, 24 VII 1957 (М. Тер-Минасян).

Larinus planus F.

Азербайджан: Талыш, Лерикский район, Мистан, 30 V 1959 (В. Рихтер); Парага, Ордубадский район, 25 V 1957 (В. Рихтер).

Larinus turbinatus Gyll.

Армения: Мегри, 31 V 1957 (В. Рихтер); Кировакан, 29 VII 1959 (В. Рихтер).

Larinus puncticeps Ter-Minassian, sp. n.

Головотрубка ♂ толще передних голеней, по длине почти равна переднеспинке, с тонким срединным килем, который доходит до места прикрепления усиков у середины головотрубки, где у ♂ и ♀ имеется небольшая неглубокая ямка, густо- и груботочечная в основной половине. 1-й и 2-й членики жгутика равны по длине, остальные короче. Головотрубка ♀ немного тоньше, слегка длиннее переднеспинки, сверху блестящая, точечность в основной половине более грубая, в вершинной тоньше, лоб довольно густоточечный с небольшой круглой ямкой между глазами. Переднеспинка с блестящим диском, сильно поперечная, почти вдвое шире своей длины у середины, сверху и по бокам сильно выпуклозакругленная, с сильной перетяжкой перед вершиной, с густой двойной точечностью: крупной, грубой, и мелкой, тонкой; без явственных заглазничных лопастей. Переднегрудь густо- и груботочечная, бока переднеспинки покрыты довольно густыми серыми волосками. Надкрылья у основания слегка шире переднеспинки, слегка менее чем в 1 1/2 раза длиннее общей ширины плеч, покрыты тонкими бороздками и пятнами из серых волосков. Промежутки между бороздками надкрылий блестящие, тонко поперечноморщинистые. Бедра толстые, не длиннее переднеспинки. Ноги покрыты тонкими серыми волосками, брюшные стерниты покрыты длинными расщепленными чешуйками. Эдеагус (рис. 1) довольно широкий, с равномерно суживающейся заостренной вершиной. Длина 7.5 мм.

Исследованный материал. Армения: ♀, дорога Горис-Кафан, 26 V 1959 (В. Рихтер); ♂ — голотип и ♀ — аллотип, Шатин, Ехегнадзорский район, 11 VII 1959 (В. Рихтер); ♂, Гергеры, Азизбековский район, 16 VI 1957 (В. Рихтер).

Близок к *L. beckeri* Petri, от которого отличается сравнительно более толстой и короткой головотрубкой, которая у ♂ в основной половине значительно более груботочечная, с прямыми основаниями надкрылий, которые у *L. beckeri* Petri близ щитка закругленные.

Larinus australis Cap.


Армения: Вединский район, Хосровский лес, 14 VII 1957 (В. Рихтер); Кавушуг, Ехегнадзорского района, 12 VII 1959 (В. Рихтер); Бюракан, 7 VII 1959 (В. Рихтер).

Larinus bardus Gyll.

Армения: ущелье р. Воротап, Горисский район, 22 VI 1959 (В. Рихтер).

Larinus tenuicorpus Ter-Minassian, sp. n.

♂. Продолговато-овальный, сравнительно узкий. Головотрубка почти равна по длине переднеспинке, толстая, явственно толще передних бедер, к вершине слегка расширена, лоб и головотрубка густо покрыты двойной точечностью, крупной и мелкой. за глазами голова лишь мелко- и густоточечная. 1-й членик жгутика усиков явственно длиннее 2-го, головотрубка сверху покрыта волосками, глаза овальные, сверху над ними длинные реснички. Переднеспинка слабопоперечная, почти на $\frac{1}{4}$ шире своей длины, бока ее слегка выпукло суживаются к вершине, сверху явственно выпуклая с заметной перетяжкой перед вершиной, с слабыми заглазничными лопастями, покрыта двойной точечностью, мелкой, очень густой и равномерной, и более крупной, редкой. На боках переднеспинки близ вершины серые волоски сгущены в виде коротких полос. Надкрылья у основания не шире переднеспинки, более чем в $1\frac{1}{2}$ раза (1.7) длиннее общей ширины у плеч, с тонкими точечными рядами и широкими и плоскими промежутками, ноги не толстые, с торчащими волосками по внутреннему краю бедер и голеней, брюшко покрыто тонкими расщепленными чешуйками. Эдеагус (рис. 2) параллельносторонний, узкий, с заостренной вершиной. Длина 9,6 мм.



Исследованный материал. Армения: ♂ — голотип, Мегри 12 V 1957 (В. Рихтер).

Рис. 1—2.

1 — *Larinus puncticeps* Ter-Minassian, sp. n. — вершина эдеагуса; 2 — *Larinus tenuicorpus* Ter-Minassian, sp. n. — вершина эдеагуса.

Близок к *L. sulphuratus* Gyll. по продолговатой форме тела, но хорошо отличается от него более узким, плоским и параллельносторонним телом, отсутствием килей на головотрубке, лишь немного заостренновытянутой близ середины переднеспинкой, в то время как у *L. sulphuratus* Gyll. она значительно глубже вдается между надкрыльями.

Larinus brevirostris Hochh.

Азербайджан: Джульфа, 23 V 1957 (В. Рихтер); Армения: Мегри, 31 V 1957 (В. Рихтер).

Larinus ?crassus Cap.

Армения: Асни, Вединский район, 12 VIII 1959 (В. Рихтер); Бюракан, 17 VII 1959 (В. Рихтер). Азербайджан: Лякетат, Джульфинский район, 30 VI 1959 (В. Рихтер).

Larinus curtus Hochh.

Армения: Джрвез, 27 VII 1957 (В. Рихтер); ущелье р. Воротап, Горисский район, 20 VI 1959 (В. Рихтер); Бюракан, 9 VII 1957 (М. Тер-Минасян).

Larinus darsi Cap.

Армения: Веди, 8 V 1957 (В. Рихтер).

Larinus lederi Fst.

Армения: Кавушуг, Ехегнадзорский район, 12 VII 1959 (В. Рихтер).

Larinus minutus Gyll.

Армения: Кавушуг, Ехегнадзорский район, 12 VII 1959 (В. Рихтер); Гергеры, Азизбековский район, 16 VI 1957 (В. Рихтер).

Larinus nubeculosus Gyll.

Севан, 24 VI 1927.

Larinus obtusus Sturm.

Армения: Джрвеж, 28 VI 1957 (В. Рихтер).

Зоологический институт
Академии наук СССР,
Ленинград.
