

**MONIEZIA (BLANCHARIEZIA) AUTUMNALIA SP. NOV. —
НОВАЯ ЦЕСТОДА ОВЕЦ И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА**

М. И. Кузнецов

Всесоюзный институт гельминтологии им. академика К. И. Скрябина, Москва

В течение последних лет при сборе и определении цестод от овец и крупного рогатого скота мы находили значительное количество мониезий, которые резко отличались от типичных *Moniezia (Blanchariezia) benedeni* (Moniez, 1879) Blanchard, 1891 и *Moniezia (Moniezia) expansa* (Rudolphi, 1810) Blanchard, 1891. Эти цестоды имели более узкую, непрозрачную, белого цвета стробилу. Длина последних зрелых члеников была равна, а часто превышала ширину. Кроме того, было замечено, что наибольшее количество таких цестод обнаруживали в осенне-зимний период, а летом их находили реже.

На основании изучения этих цестод было установлено, что они являются новым видом рода *Moniezia* R. Blanchard, 1891, подрода *Blanchariezia* Skrjabin et Schulz, 1937. Описываемый вид мы называем *M. (Bl.) autumnalia* sp. nov. В названии вида (*autumnalia* — осенняя) отражена его сезонность.

***Moniezia (Blanchariezia) autumnalia* Kuznetsov sp. nov. (рис. 1)**

Хозяин: овцы и крупный рогатый скот.

Локализация: тонкий отдел кишечника.

Место и время обнаружения: Калужская, Калининская, Волгоградская и Саратовская области. Осенне-зимний период.

Материал: изучено более 50 экз. от крупного рогатого скота и овец.

Описание вида. Длина свежих цестод со зрелыми члениками от 160 до 284 см, максимальная ширина 6—8 мм, толщина 0.8—1.2 мм. Стробила белого цвета, плотная непрозрачная. Сравнительно крупный сколекс имеет 1.9 мм в ширину и до 1.73 мм в длину. Бокаловидные присоски 0.48—0.50 мм в диаметре и высотой 0.36—0.38 мм направлены косо вперед. Сегментация начинается на расстоянии 2.8—3.2 мм от сколекса.

На расстоянии 20—22 см от сколекса и далее в передней части члеников видны межпроглоттидные железы линейного типа, расположенные на вентральной и дорзальной сторонах стробилы по средней линии. Длина полюсы межпроглоттидных желез в гермафродитных члениках от 0.53 до 1.06 мм, ширина 0.12—0.25 мм, причем на дорзальной стороне полюса часто распадается на две полоски. Имеются дорзальные и вентральные экскреторные сосуды.

Гермафродитные членики (с развитыми мужскими и женскими половыми железами): ширина 2.4—3, длина 1.5—2 и толщина 0.75—1 мм. В передней трети каждого бокового края членика выступают половые сосочки 0.11—0.22 мм в диаметре, расположенные на вершине хорошо развитого полового бугорка. Половые отверстия двусторонние. Семенники в гермафродитных члениках многочисленны (от 247 до 366), расположены равномерно по всей длине и ширине среднего поля между женскими поло-

выми железами, позади яичника и желточника, но не заходят за переднюю и латеральную границы яичника и не примыкают к линии экскреторных сосудов. Размер семенников 0.057—0.074 мм в диаметре. Вагина открывается позади и вентрально от бursы цирруса на правой стороне стробилы и позади и дорзально на левой. Половые протоки проходят дорзально от экскреторных сосудов и нерва. Ветви семяпровода начинаются медиально и каудально от желез женского комплекса, затем семяпровод проходит косо вперед дорзально над яичником, не заходя за его переднюю гра-





Рис. 1. *Moniezia autumnalia* sp. nov.
Сколекс и гермафродитный членик.



ницу, поворачивает назад и входит в бурсу цирруса. До пересечения экскреторных сосудов семяпровод образует многочисленные крупные извилины. После пересечения сосудов и в бурсе семяпровод не образует заметных петель. Циррус невооруженный, толщиной 0.022 мм. Бурса цирруса длиной 0.167—0.180 мм и шириной 0.074—0.092 мм. Два комплекса женских половых желез располагаются на поральных частях передней половины членика. Яичник лопастной, состоит из булавовидных долек, расходящихся веерообразно, причем выпуклая сторона его обращена и почти прилегает к переднему краю членика. Ширина яичника 0.657—0.848 мм. Желточник 0.190—0.215 мм в диаметре состоит из мелких долек и расположен между лопастями яичника, которые подходят к нему с двух сторон. В промежутке между желточником и задним вогнутым краем яичника лежит небольшое тельце Мелиса. Копулятивный отдел вагины длиной 0.275—0.339 мм, неравномерной толщины (0.044—0.030 мм) располагается позади бursы цирруса и семяпровода. Семеприемник реторто-видной или грушевидной формы, длиной 0.212—0.381 мм, наибольшая ширина 0.070—0.111 мм. В члениках 5—6 мм ширины и 4—5 мм длины видна сетчатая матка, которая распространяется во всю длину и ширину слоя мозговой паренхимы, заходя за линию экскреторных сосудов. В задних члениках стробилы, содержащих наполненную яйцами матку с расширенными анастомозирующими трубками, половые железы подвергаются редукции, а остаются заметными только семеприемник и бурса цирруса. Такие членики имеют 4—6 мм в ширину и 4—7 мм в длину, т. е. длина про-

веерообразно, причем выпуклая сторона его обращена и почти прилегает к переднему краю членика. Ширина яичника 0.657—0.848 мм. Желточник 0.190—0.215 мм в диаметре состоит из мелких долек и расположен между лопастями яичника, которые подходят к нему с двух сторон. В промежутке между желточником и задним вогнутым краем яичника лежит небольшое тельце Мелиса. Копулятивный отдел вагины длиной 0.275—0.339 мм, неравномерной толщины (0.044—0.030 мм) располагается позади бursы цирруса и семяпровода. Семеприемник реторто-видной или грушевидной формы, длиной 0.212—0.381 мм, наибольшая ширина 0.070—0.111 мм. В члениках 5—6 мм ширины и 4—5 мм длины видна сетчатая матка, которая распространяется во всю длину и ширину слоя мозговой паренхимы, заходя за линию экскреторных сосудов. В задних члениках стробилы, содержащих наполненную яйцами матку с расширенными анастомозирующими трубками, половые железы подвергаются редукции, а остаются заметными только семеприемник и бурса цирруса. Такие членики имеют 4—6 мм в ширину и 4—7 мм в длину, т. е. длина про-

глоттид часто превышает ширину. В последних члениках, содержащих зрелые яйца, матка мешковидная.

Зрелые яйца десяти-, реже двенадцатигранной формы, размером 0.074—0.096 мм, грушевидный аппарат длиной 0.057—0.070 мм, диаметр онкосферы 0.017—0.022 мм, эмбриональные крючья 0.007 мм длины.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Подрод *Blanchariezia* по А. А. Спасскому (1951) насчитывал только два вида: *M. (B.) benedeni* и *M. (B.) pallida* Mönnig, 1926, которые характеризуются наличием межпроглоттидных желез линейного типа.

От *M. (B.) benedeni* наш новый вид отличается следующими особенностями и признаками:

1. Внешним видом стробил. У *M. benedeni* тонкая, полупрозрачная и очень широкая стробила (до 26 мм), беловато-желтоватого цвета, причем зрелые, набитые яйцами проглоттиды шафранно-оранжевого цвета.




Рис. 2. *Moniezia benedeni* (Moniez, 1879) Blanchard, 1891. Гермафродитный членик (оригинал).

У *M. autumnalia* стробила сравнительно толстая, плотная и непрозрачная, белого цвета на всем протяжении, наибольшая ширина не превышает 6—8 мм.

2. Ширина члеников у *M. benedeni* на всем протяжении стробилы превышает длину в 4—5 и более раз. У гермафродитных члеников *M. autumnalia* ширина превышает длину лишь в 1.5 раза, а в члениках, содержащих матку с яйцами, длина часто превышает ширину.

3. Расположением и числом семенников. У *M. benedeni* семенников больше (420—660) и располагаются они неравномерной полосой, причем наибольшее число фолликулов лежит в районе женских половых желез, которые окружены ими с трех сторон (рис. 2). Семенники заходят за переднюю и латеральную границы яичника и примыкают к линии экскреторных сосудов.

Число семенников у *M. autumnalia* почти в 2 раза меньше (247—366). Они располагаются равномерно по всей ширине и длине среднего поля, не заходят за латеральную и переднюю границы яичника и не примыкают к линии экскреторных сосудов.

4. Семяпровод у *M. benedeni* длинный, образует неправильную спираль, идет над яичником по направлению вперед и в сторону, почти доходя до передней границы членика, затем резко поворачивает под прямым углом и пересекает экскреторные сосуды, следуя уже назад и по направлению к бурсе цирруса. У *M. autumnalia* семяпровод на пути следования от яичника не образует прямого угла и не заходит за переднюю границу яичника, а, извиваясь, идет почти в одном направлении.

5. Семеприемник у *M. benedeni* имеет сигарообразную или овальную форму длиной 0.45—0.77 мм, у описываемого вида семеприемник реторто-видный или грушевидный и более короткий (0.212—0.381 мм в длину).

