УЛК 576.895.122.2

УЛЬТРАТОНКАЯ МОРФОЛОГИЯ ПОКРОВОВ СКРЕБНЕЙ (ACANTHOCEPHALA)

© В. П. Никишин

Обобщены литературные сведения и собственные данные по тонкой морфологии тегумента акантоцефалов.

Представления об организации покровов скребней до применения в исследованиях методов электронной микроскопии были противоречивыми. Наиболее спорными были вопросы о строении кутикулы и субкутикулы, а также о количестве и организации слоев гиподермы. Только сравнительно недавно была показана нецелесообразность разделения субкутикулярной части покрова на субкутикулу и гиподерму (Богоявленский, Иванова, 1978). Результаты ультраструктурных исследований подтвердили правомерность такого подхода, поскольку покровная ткань имеет клеточное, точнее симпластическое, строение и снаружи и изнутри ограничена цитоплазматическими мембранами. Эти результаты также позволили усомниться в справедливости использования терминов «кутикула» и «гиподерма» (Lumsden, 1975; Miller, Dunagan, 1985). Последние авторы из множества терминов, предложенных разными исследователями для обозначения поверхностного цитоплазматического слоя стенки тела скребней, предпочли термин «тегумент», обосновав свой выбор тем, что под этим термином во всех случаях понимается живая, активно функционирующая (в отличие от кутикулы) ткань, имеющая симпластическое или синцитиальное строение.

Полностью поддерживая такой взгляд, мы в качестве дополнительного аргумента считаем нужным заметить, что первоначально тегументом было принято называть покровы паразитических плоских червей, образованные поверхностным цитоплазматическим слоем, связанным с погруженными клеточными телами, содержащими ядра. Покровная ткань скребней отличается от синцитиального тегумента паразитических Plathelminthes тем, что ядра располагаются в толще поверхностного цитоплазматического слоя. В сущности же в обоих случаях покровная ткань представлена единым многоядерным образованием и в отличие от типичных эпителиев не состоит из отдельных клеток. Необходимо также учитывать полифункциональность тегумента, посредством которого осуществляется не только питание гельминта, но и защита его от негативных воздействий хозяина или окружающей среды. Все вышесказанное, на наш взгляд, вполне обосновывает правомерность использования термина «тегумент» для обозначения покровной ткани акантоцефал.

Тегумент скребней является уникальной покровной структурой и не имеет аналогов среди покровных тканей других паразитических червей. Результаты сравнительно немногочисленных электронно-микроскопических исследований (табл. 1) подтвердили правомерность выделения на основании гистологических и гистохимических данных в его составе трех слоев и в свою очередь явились основанием для более дробного деления этих слоев. Целесообразность такого разделения мы будем обсуждать в соответствующих разделах, а за основу примем терминологию, используемую в отечественной литературе.

Таблица 1
Состояние изученности тонкой морфологии тегумента акантоцефалов
Тable 1. Ultrustructural morphological studies of Acanthocephala

Вид исследованных акантоцефалов	Автор исследований	Изученный фрагмент тегумента, стадия развития гельминта	
Moniliformis moniliformis	Nicholas, Mercer, 1965		
	Rothman, 1967	Поверхностный отдел тегумента	
	Wright, Lumsden, 1968	Гликокаликс	
	Wright, Lumsden, 1969	Поперечно-волокнистый слой	
	Byram, Fisher, 1973	Tronepe me Bestekimerbin esten	
	Graeber, Storch, 1978		
	Hutton, Oetinger, 1980	Акантелла, хоботковые крючья	
	Taraschewski e. a., 1989	Akairresisia, Accordobile Apic iba	
Macroacanthorhynchus hirudinaceus	Rothman, Rosario, 1961		
nace sacan morny nervas vin admace as	Diaz Cosin, 1972	,	
	Graeber, Storch, 1978		
	Zhao e. a., 1990	Тегумент хоботковых крючьев	
Acanthocephalus lucii	Graeber, Storch, 1978	Teryment Receive Bank Rapie 1868	
Acanthocephalus ranae	Hammond, 1967		
Echinorhynchus gadi	Lange, 1970		
Zenmornynenus guui	Graeber, Storch, 1978	***	
	Cho, 1981		
	Бобровских, 1992		
Pomphorhynchus laevis	Stranack e. a., 1966		
1 omphornyhenus tuevis	Wanstall e. a., 1990	Тегумент пресомы	
Arhythmorhynchus petrochenkoi	Никишин, 1985	Поздняя акантелла	
Polymorphus magnus	Никишин с соавт., 1994	Цистакант	
Polymorphus minutus	Crompton, Lee, 1965	Zinorukum	
1 orymorphius minutus	Butterworth, 1969	Развивающаяся акантелла	
	Graeber, Storch, 1978	T aspinbalonaron anamestia	
Polymorphus strumosoides	Никишин, 1986	Цистакант	
Octospinifer macilentus	Beerman e. a., 1974	and a second sec	
Neoechinorhynchus rutili	Taraschewski, 1989a	Тегумент пресомы	
Paratenuisentis ambiguus	Taraschewski, 19896	» »	

В составе тегумента мы выделяем гликокаликс, покровный комплекс, пять слоев (поперечно-волокнистый, везикулярный, войлочно-волокнистый, радиально-волокнистый и трубочковый) и внутреннюю цитоплазматическую мембрану (рис. 1). Помимо тегумента к комплексу покровных образований следует отнести базальную пластинку, два слоя субповерхностной мускулатуры и немногочисленные нервные окончания, локализующиеся в области пресомы.

Гликокаликс. Под этим термином понимается слой тонкоструктурированного материала, прилежащего к внешней поверхности наружной цитоплазматической мембраны тегумента. При гистохимических исследованиях гликокаликс выявляется в виде тонкой пленки (эпикутикулы — Crompton, 1963) около 1 мкм толщины (Богоявленский, Иванова, 1978). Электронно-микроскопические и цитохимические исследования показали существенное морфологическое сходство эпикутикулы с типичным гликокаликсом, что дало основание для использования этого термина при описании покровов скребней (Wright, Lumsden, 1968).

На ультратонких срезах гликокаликс взрослых скребней представляет собой обычно прерывистый слой рыхлого материала, образованного тончайшими перепле-




Рис. 1. Обобщенная схема тонкого строения тегумента скребней.

BBC — войлочно-волокнистый слой; BC — везикулярный слой; BLM — базальная цитоплазматическая мембрана тегумента; T — гликокаликс; K — каналы; KT — комплекс Гольджи; J — лизосомы; JK — липидные капли; JK — липидные капли; JK — матохондрии; JK — наружная (апикальная) цитоплазматическая мембрана тегумента; JK — продольные волокна; JK — поперечно-волокнистый слой; JK — покровный комплекс; JK — радиальные волокна; JK — радиально-волокнистый слой; JK — трубочковый слой; JK — циркулярные волокна; JK — эндоплазматическая сеть; JK — ядро.

Fig. 1. General scheme of regument ultrastructure of Acanthocephala.

тающимися филаментами, мелкими гранулами (Graeber, Storch, 1978) или аморфным матриксом с включением электронноплотных частиц (Бобровских, 1992). Диаметр филаментов не превышает 10 нм (Nicholas, Mercer, 1965). Гликокаликс выявляется у большинства исследованных скребней, однако толщина его варьирует у разных видов от 0.02 мкм — у Acanthocephalus ranae (Hammond, 1967) и Polymorphus minutus (Graeber, Storch, 1978) до 0.8 — у Macroacanthorhynchus hirudinaceus (Graeber, Storch, 1978) и даже до 1 мкм — у Moniliformis moniliformis (Nicholas, Mercer, 1965). С другой стороны, по данным разных авторов, исследовавших одни и те же виды, нередко наблюдаются значительные расхождения в численных значениях толщины гликокаликса. Например, у Echinorhynchus gadi эта величина колеблется от 17—25

(Graeber, Storch, 1978) до 36 (Бобровских, 1992) и даже до 50—100 нм (Lange, 1970), у М. moniliformis — от 0.26—0.32 (Byram, Fisher, 1973) до 1 мкм (Nicholas, Mercer, 1965), а у М. hirudinaceus — от 0.16—0.2 (Diaz Cosin, 1972) до 0.8 мкм (Graeber, Storch, 1978). Такой разброс в значениях может быть объяснен либо различиями в методике подготовки объектов к исследованиям, либо физиологическими особенностями исследованных гельминтов.

В большей мере совпадают мнения исследователей относительно химического состава гликокаликса. Показано, что его основными компонентами являются кислые (Моппе, 1959; Crompton, 1963; Crompton, Lee, 1963; Nicholas, Mercer, 1965, и др.) и нейтральные мукополисахариды и/или гликопротеины (Wright, Lumsden, 1968). Установлено, что фосфатазная активность в гликокаликсе не проявляется (Rothman, 1967); также нет сведений о наличии в нем каких-либо других ферментов.

Гликокаликс выявляется не только у взрослых скребней, но и у личинок в течение всего периода ларвогенеза (Lumsden, 1975). Правда, Баттерворт (Butterworth, 1969) не отметила его наличия у личинок P. minutus на протяжении их развития от ранней акантеллы до цистаканта, однако, по другим сведениям, именно у цистакантов ряда исследованных видов (в том числе и у полиморфов) толщина гликокаликса достигает наибольших значений по сравнению с другими стадиями онтогенеза и составляет 0.7—1.4 мкм — у М. moniliformis (Wright, Lumsden, 1968) и 0.6—1.9 — у Р. strumosoides (Никишин, 1986). В последнем случае гликокаликс характеризуется наличием многочисленных радиально ориентированных «ребер», пронизывающих всю его толщину. «Ребра» образованы конденсированным материалом гликокаликса и, по-видимому, играют роль армирующих элементов (Краснощеков, Никишин, 1986; Никишин, 1986). У цистакантов P. magnus гликокаликс также пронизан «ребрами», а его толщина колеблется от 1 до 1.5 мкм (Никишин и др., 1994). Необходимо отметить, что во всех этих случаях гликокаликс почти полностью покрывает цистакантов, за исключением инвагинированных отделов тела (пресома и задний отдел метасомы), на поверхности которых гликокаликс остается «личиночным».

В гораздо меньшей степени, чем у цистакантов или взрослых червей, выражен гликокаликс у формирующихся личинок (Wright, Lumsden, 1968). У поздней акантеллы Arhythmorhynchus petrochenkoi он представлен тонким прерывистым слоем (Никишин, 1985). У развивающейся акантеллы Filicollis anatis, поверхность которой покрыта микроворсинками, гликокаликс по своему строению сходен с таковым типичных клеток кишечного эпителия и выявляется в виде легкой «бахромы», покрывающей поверхность тегумента, микроворсинок и отшнуровывающихся от них пузырьков (Nikishin, 1992). На основании этих сведений мы предположили, что мощный слой гликокаликса у цистакантов формируется в течение достаточно короткого отрезка времени после инвагинации пресомы (Никишин, 1986). В этом случае отсутствие такого гликокаликса у развитых личинок P. minutus (Butterworth, 1969) можно объяснить тем, что они еще не достигли инвазионной зрелости и характерный для цистакантов гликокаликс еще не сформировался.

По-видимому, именно наличие толстого слоя гликокаликса у полностью сформированных личинок скребней послужило основанием для введения по отношению к ним термина «цистакант». Однако типичной цисты при «инцистировании» акантелл в организме промежуточного хозяина не образуется (Cable, Dill, 1967) и поэтому применение этого термина, со строго научной точки зрения, не правомерно. Тем не менее во избежание путаницы представляется целесообразным сохранение традиционной терминологии, имея в виду, что оболочка «цисты», покрывающая инцистированных личинок скребней, фактически является слоем гликокаликса.

Обращает на себя внимание морфологическое сходство гликокаликса цистакантов и имеющегося на поверхности цисты зрелых личинок цестод отряда Cyclophyllidea — цистицеркоидов. У последних, как и у цистакантов, гликокаликс представляет собой толстый (до 2 мкм и более) слой тонкофибриллярного или гомогенного материала и пронизан армирующими элементами — извитыми трубочками, являющимися модифицированными микроворсинками (Краснощеков, Никитин, 1979а, 19796; Красно-




Рис. 2. Схема строения различных модификаций гликокаликса скребней. Обозначения такие же, как на рис. 1.

Fig. 2. Scheme of different glycocalyx modifications in Acanthocephala.

щеков и др., 1983, и др.). Как и у цистакантов гликокаликс цистицеркоидов формируется на завершающей стадии ларвогенеза в течение короткого промежутка времени (Краснощеков, Никишин, 1986).

Таким образом, акантоцефалы на протяжении их жизненного цикла характеризуются как минимум тремя морфологически различными формами гликокаликса, соответствующими стадиям развивающейся акантеллы, цистаканта и взрослой особи (рис. 2). Четвертая форма гликокаликса, по-видимому, должна соответствовать акантору. Хотя обычными электронно-микроскопическими методиками гликокаликс на поверхности эмбриональных личинок *P. magnus* не удалось дифференцировать (Никишин, Краснощеков, 1990), применение в качестве контрастера диоксида тория позволило выявить его прерывистый слой на поверхности аканторов *M. dubius* (Wright, Lumsden, 1970).

Вопрос о функциях гликокаликса как структуры, непосредственно контактирующей с тканями хозяина, имеет принципиальное значение для понимания всего сложного комплекса взаимосвязей паразита и хозяина. Проанализировав многочисленные работы, касающиеся роли гликокаликса у плоских червей, Краснощеков (1979) пришел к выводу, что важнейшей функцией гликокаликса является инактивация протеолитических ферментов хозяина. Предполагалось также, что гликокаликс обеспечивает транспорт ионов в тегумент, принимает участие в расщеплении различных субстанций либо собственными ферментами червей, либо адсорбированными ферментами хозяина, а также может играть роль в защите гельминтов от механических воздействий и тканевых реакций хозяина. Учитывая морфологическое сходство гликокаликса скребней и паразитических плоских червей, однотипность условий обитания этих гельминтов, вполне правомочно распространить упомянутые гипотезы и на гликокаликс скребней. Анализ литературы, касающийся этого аспекта, свидетельствует, что предположение Монне (Моппе, 1959) о значении гликокаликса акантоцефал в защите от протеолитических энзимов хозяина поддерживается большинством авторов (Wright, Lumsden,

1968; Lumsden, 1975; Богоявленский, Иванова, 1978). Однако в отличие от цестод гликокаликс скребней действует не как ингибитор ферментов хозяина (Ruff e. a., 1973), а как электростатическое сито, непроницаемое для этих ферментов (Wright, Lumsden, 1968). Предполагается также (Wright, Lumsden, 1968), что гликокаликс скребней может действовать аналогично ионообменным смолам, способствуя избирательному транспорту ионов в покровные ткани.

Функции гликокаликса цистакантов, имеющего уникальную структуру, по-видимому, заключаются в обеспечении инвазии окончательного хозяина. Предполагалось, что у цистицеркоидов он обеспечивает адгезию личинки к стенке кишечника хозяина после освобождения личинки от защитных оболочек (Rees, 1973; Gabrion, Gabrion, 1975; Краснощеков, 1979). Возможно, это предположение справедливо и для цистакантов. Однако нельзя не учитывать, что у цистакантов, как и у цистицеркоидов, мощный слой гликокаликса формируется на завершающем этапе ларвогенеза одновременно с переходом полностью развитых личинок в состояние «диапаузы». Это дало основание рассматривать гликокаликс ларвоцист как адаптацию к обеспечению их длительного переживания в промежуточном хозяине. Предположено, что в этом случае активная защита развивающих личинок от клеточных реакций хозяина меняется на пассивную, действующую по принципу биохимической мимикрии (Краснощеков, Никишин, 1986).

Покровный комплекс. Электронно-микроскопические исследования убедительно доказали отсутствие у скребней, как и у плоских червей, типичной кутикулы, характерной, например, для нематод, аннелид или артропод (Byram, Fisher, 1973; Lumsden, 1975; Chappell, 1980, и др.). Тегумент всех исследованных скребней покрыт снаружи цитоплазматической мембраной, имеющей типичную структуру. Толщина ее, по разным данным, варьирует от 8 (Nicholas, Mercer, 1965) до 12.5 нм (Wright, Lumsden, 1968). Чаще указываются значения 11.5—12 нм (Byram, Fisher, 1973; Graeber, Storch, 1978). С наружной мембраной тесно связан прилежащий гликокаликс.

Большинство исследователей подчеркивают сложную, многослойную, но в то же время сходную у разных видов организацию поверхностной части покрова скребней. Отмечаемые различия касаются главным образом структуры, непосредственно подстилающей поверхностную мембрану. Ее интерпретируют как кутикулу (Crompton, Lee, 1965; Diaz Cosin, 1972; Beerman e. a., 1974), электронноплотную полоску (Stranack e. a., 1966), перфорированный слой (Lange, 1970) или субплазматическую мембрану (Nicholas, Mercer, 1965; Graeber, Storch, 1978). По мнению Хаммонда (Hammond, 1967), поверхность A. ranae образована кутикулой, которая ограничена снаружи цитоплазматической мембраной, а изнутри — мембраной неясного строения около 8 нм толщины. У М. moniliformis в участке тегумента, расположенном под поверхностной мембраной, описана «терминальная паутина», материал которой апикально сгущается в виде слоя 10 нм толщины. От мембраны этот слой отделен слоем свободной от органелл и включений цитоплазмы 26 нм толщины (Byram, Fisher, 1973). У E. gadi под наружной мембраной имеется слой электронноплотного материала 48 нм толщины, отделенный от глубже расположенного кортикального матрикса узким светлым пространством (Бобровских, 1992). В сущности во всех случаях речь идет о двух пластинковидных образованиях, расположенных под цитоплазматической мембраной. Наружная пластинка, в работах ранних авторов именуемая кутикулой, или вплотную прилежит к поверхностной мембране (Crompton, Lee, 1965; Hammond, 1967; Веегтап е. а., 1974), или находится от нее на некотором расстоянии (от 15 нм — Lange, 1970 до 53 нм — Graeber, Storch, 1978). На основании ее поверхностного, но внутрисимпластического расположения мы предложили для нее термин «псевдокутикулярная пластинка» (Никишин, 1985, 1986). Вплотную к ней или на некотором расстоянии (15 нм — Никишин, 1985) расположена вторая пластинковидная структура, образованная материалом высокой электронной плотности. Очевидно, что термин «субплазматическая мембрана» (Wright, Lumsden, 1969) в этом случае некорректен. Учитывая вышесказанное, нам представляется целесообразным объединение наружной цитоплазматической мембраны и обеих пластинковидных структур одним понятием «покровный комплекс» (Никишин, 1985).

Процесс формирования покровного комплекса в онтогенезе остается до конца не изученным. Тем не менее имеющиеся разрозненные сведения позволяют предполагать, что покровный комплекс формируется еще на завершающей стадии морфогенеза и в дальнейшем существенных изменений не претерпевает. Так, у акантора *P. magnus* общая толщина комплекса составляет 30—40 нм (Никишин, Краснощеков, 1990), у поздней акантеллы *A. petrochenkoi* — около 50 (Никишин, 1985), у цистакантов *P. strumosoides* 50—80 (Никишин, 1986) и *P. magnus* — 50—100 нм (Никишин и др., 1994). У взрослых гельминтов его размеры колеблются в тех же пределах. Это позволяет предположить, что адаптация скребней к условиям жизни в разных хозяевах и к их смене осуществляется не в результате морфологической перестройки покровов, а путем смены форм гликокаликса (Никишин, Краснощеков, 1990).

Поперечно-волокнистый слой. Термин впервые использован Барабашовой (1965). В западной литературе утвердилось название «полосатый слой» (striped layer, Streifenzone). Тем самым подчеркивается его исчерченность в радиальном направлении, видимая в световом микроскопе и вызванная наличием в нем многочисленных каналов. Протяженность этих каналов и определяет толщину описываемого слоя, которая варьирует от 1—4 мкм у неоехиноринхид до 6—10 — у олигаканторинхид, полиморфид или филликолид (Богоявленский, Иванова, 1978).

Термины «каналы» или «поры-каналы» используются большинством авторов, хотя, строго говоря, они таковыми не являются, а представляют собой инвагинации поверхностной цитоплазматической мембраны. Морфологические особенности описываемых структур точно отражают термин «крипты» (Вугат, Fisher, 1973; Taraschewski, 1989а, 1989б), однако распространения этот термин пока не получил. Нам представляется целесообразным пока придерживаться наиболее распространенной терминологии во избежание путаницы.

Морфология каналов достаточно однотипна у разных видов, но имеются некоторые различия между каналами метасомы и пресомы. В области метасомы каналы имеют ампуловидную форму с расширенной базальной частью. Во многих случаях наблюдается ветвление каналов. Впрочем, у неоднократно изученных видов сведения разных авторов по этому факту могут быть прямо противоположными, например у E. gadi, P. minutus или M. moniliformis. Предполагается, что такие различия могут быть связаны с различным физиологическим состоянием исследованных червей (Graeber, Storch, 1978).

Диаметр устьев каналов варьирует в довольно широких пределах: у Pomphorhynchus laevis — около 15 нм (Stranack e. a., 1966), у М. hirudinaceus — около 30 (Diaz Cosin, 1972), у M. moniliformis — 12—42 (Byram, Fisher, 1973), у A. ranae — около 50, у E. gadi — от 40—50 (Graeber, Storch, 1978) — до 60—70 (Lange, 1970), у A. lucii — 20 нм (Graeber, Storch, 1978). В ряде случаев диаметр пор измерить не удается ввиду их малых размеров или же из-за материала, заполняющего их просветы (Graeber, Storch, 1978). По нашим сведениям, у цистакантов P. strumosoides диаметр пор составляет 12—18 нм, однако некоторые поры расширены до 47 нм (Никишин, 1986). У цистакантов Р. magnus диаметр пор не превышает 60 нм (Никишин и др., 1994), а у поздней акантеллы A. petrochenkoi некоторые поры расширены до 90 нм (Никишин, 1985). Размер пор имеет принципиальное значение, поскольку система каналов рассматривается как механизм увеличения площади сорбционной поверхности. У M. moniliformis показано 44-кратное увеличение поверхности (Byram, Fisher, 1973). Однако Граебер и Шторх считают это значение ошибочным; по их расчетам, увеличение у этого вида не превышает 27-кратного. Для A. lucii и P. minutus, у которых каналы также не ветвятся (Graeber, Storch, 1978), расчетное увеличение площади поверхности составляет соответственно 20 и 29 крат, а для E. gadi с сильно ветвящимися каналами это значение достигает 62 крат (Graeber, Storch, 1978). Диаметр пор зависит не только от таксономического положения исследуемого скребня, но и (возможно, в гораздо большей степени) от его физиологического

состояния или стадии развития. По нашим данным, у развивающихся акантелл Filicollis anatis количество пор даже визуально значительно превышает таковое у взрослых гельминтов, а их диаметр достигает 90 нм, что связано с активностью каналов, через которые происходит секреция материала капсулы. После завершения секреции диаметр пор не превышает 30 нм (Nikishin, 1992). Приведенный пример также свидетельствует о полифункциональности каналов, функции которых меняются в зависимости от стадии развития скребня.

На большем своем протяжении каналы окружены плотным материалом (интрасимпластное уплотнение — Вельш, Шторх, 1976, кортикальный матрикс — Бобровских, 1993; осмиофильный материал — Никишин и др., 1994), остальная часть слоя заполнена мелкозернистой цитоплазмой с небольшим количеством включений. Интересная особенность выявлена в строении этого слоя у *E. gadi* (Lange, 1970; Бобровских, 1992). У представителей этого вида кортикальный матрикс заполняет не всю дистальную часть полосатого слоя. Вокруг каналов выявляется узкий слой более светлой цитоплазмы. Таким образом, каждый тегументальный канал находится в своеобразном «отростке» глубжележащей цитоплазмы. Внимательное изучение иллюстраций в работах других авторов позволяет предполагать наличие сходных особенностей и у некоторых других видов.

У скребней M. moniliformis в поперечно-волокнистом слое описана «терминальная паутина», образованная компактно расположенными филаментами, которые представляют собой цепочки плотного материала в виде мелких бусинок или дисков (Byram, Fisher, 1973). По мнению этих авторов, такая структура поверхностной части тегумента сходна с «терминальной паутиной» многих типичных эпителиальных клеток и выполняет стабилизирующую функцию, противодействуя механическому воздействию на этот слой. Аналогичная филаментная сеть отмечена у средних акантелл P. minutus (Butterworth, 1969) и F. anatis (наши неопубликованные данные), однако у поздней акантеллы A. petrochenkoi он не выявлен (Никишин, 1985). Это различие трудно интерпретировать ввиду недостатка данных, однако, на наш взгляд, оно скорее может быть связано с особенностями экологии или физиологии исследованных червей, нежели является видовой их характеристикой. Необходимо подчеркнуть, что личинки, у которых отмечена «терминальная паутина», выращивались в условиях эксперимента, а акантеллы A. petrochenkoi были извлечены из спонтанно инвазированных рачков. В любом случае поперечно-волокнистый слой тегумента цистакантов по своим основным ультраструктурным характеристикам не отличается от такового у взрослых скребней.

Везикулярный слой. Термин введен Баттерворт (Butterworth, 1969). Ранее этот слой рассматривался как внутренняя часть поперечно-волокнистого слоя (Вугат, Fisher, 1973) или как дистальная часть глубжележащего войлочно-волокнистого слоя. Однако в отличие от последнего в нем отсутствуют волокна, ориентированные параллельно поверхности тела, но имеются органеллы (по данным разных авторов: митохондрии, элементы эндоплазматического ретикулума, лизосомы, рибосомы) и включения (везикулы различной морфологии, липидные капли), что и явилось основанием для выделения этого участка тегумента в самостоятельный слой (Nicholas, Mercer, 1965; Hammond, 1967; Graeber, Storch, 1978). В его наружной части заканчиваются каналы, пересекающие поперечно-волокнистый слой тегумента. Целесообразность выделения везикулярного слоя подчеркивается не только его отличной от соседних слоев морфологией, но и его очевидным значением в метаболизме скребней. В пользу этого свидетельствуют интересные результаты исследований скребней M. moniliformis. Большое количество мембранных пузырьков в этом слое на основании положительных тестов на кислую фосфатазу идентифицированы как лизосомы (Byram, Fisher, 1973). Авторами выделены пять типов лизосом, из которых четыре обнаруживаются в везикулярном слое. По их мнению, лизосомы этого слоя сливаются с пиноцитозными пузырьками и таким образом обеспечивают утилизацию их содержимого. Также получены данные, свидетельствующие о миграции везикул слоя в расширенные окончания каналов поперечно-волокнистого отдела (Никишин и др., 1994). Функциональное значение этого процесса остается неясным: либо он является морфологическим выражением секреции материала гликокаликса, либо отражает процесс экскреции продуктов метаболизма.

Войлочно-волокнистый слой. Название дано Мейером (Меуег, 1933 — Filzfaserschichte). В настоящее время в зарубежной литературе чаще используется термин «войлочный слой» (felt laver). Этот слой не имеет морфологически оформленных границ, однако легко дифференцируется по имеющимся в нем многочисленным волокнам, расположенным в плоскости, параллельной поверхности тела червей. Ориентация волокон, их количество и размеры различны у представителей разных систематических групп и могут широко варьировать даже в пределах одного семейства. Богоявленский и Иванова (1978) отмечают, что наиболее просто войлочно-волокнистый слой тегумента организован у представителей сем. Neoechinorhynchidae, у которых кольцевые и продольные волокна более или менее равномерно распределены по всему слою (что подтверждается результатами электронно-микроскопических исследований — Beermann e. a., 1974), имеют меньшие, чем у представителей других семейств, размеры и слабее окрашиваются гистохимическими красителями. У многих эхиноринхид эти волокна имеют больший диаметр и оформлены в группы или слои, количество которых варьирует у разных видов от 3 до 6. У представителей других семейств (Polymorphidae, Pomphorhynchidae, Filicoliidae, Rhadinorhynchidae и Oligacanthorhynchidae) продольные и кольцевые волокна организованы в виде четко оформленных чередующихся групп.

К сожалению, лишь в некоторых работах, выполненных с применением электронной микроскопии, имеются сведения о расположении и морфологии волокон войлочного слоя. Так, у *E. gadi* волокна организованы в 3 слоя, крайние из которых имеют продольную ориентацию, а центральный — поперечную (Бобровских, 1992). У цистакантов *P. strumosoides* и *P. magnus* можно выделить 5 слоев, в которых волокна различаются по ориентации и размерам (Никишин, 1986; Никишин и др., 1994). Элементы крайних и центрального слоев ориентированы в продольном направлении и имеют в диаметре 0.15—0.2 мкм, волокна 2 других слоев ориентированы в поперечном направлении и имеют в диаметре 0.25—0.35 мкм. Каждое волокно имеет вид толстостенной незамкнутой трубки, стенка которой образована филаментами 40—50 нм толщины.

Сходное строение имеют волокна войлочного слоя у скребней других видов, при этом их диаметр может быть или примерно таким же (0.16—0.39 мкм у Е. gadi — Lange, 1970) или же немного меньшим (0.06—0.12 мкм у М. moniliformis — Byram, Fisher, 1973). Во всех случаях, однако, отмечается сложная структура волокон, образованных более тонкими филаментами. Протяженность каждого волокна на ультратонких срезах в большинстве случаев измерить не удается.

В последнее время появляются сведения о более сложной организации фиброзных компонентов в этом слое. У Е. gadi здесь обнаружены три типа фиброзных структур (Бобровских, 1992): микрофибриллы в диаметре 50 нм, электронноплотные фибриллы — 0.26 и 1.18 мкм длины и волокна (аналогичные вышеупомянутым) до 4.8 мкм максимальной длины и в диаметре 0.24—0.36 мкм. Последние образованы электронноплотным материалом, в толщине которого выявляются от 3 до 11 узких светлых продольных канала; при этом толщина «стенок» волокон составляет 60 нм.

Кроме волокон в этом слое обнаруживается довольно богатый набор органелл и включений, в определенной степени варьирующий у разных видов. Помимо митохондрий и разнообразных везикул, характерных для почти всех изученных видов, здесь отмечаются: у *М. moniliformis*, по одним сведениям — капли липидов, частицы гликогена и лизосомы (Вугат, Fisher, 1973), по другим — элементы гладкой эндоплазматической сети (ЭС), комплекс Гольджи, липиды и гликоген (Nicholas, Mercer, 1965); у *Р. laevis* — гладкая ЭС (Stranack e. a., 1966); у *А. ranae* — комплекс Гольджи и предположительно рибосомы и частицы гликогена (Hammond, 1967); у *М. hirudinaceus* — лизосомы и гладкая ЭС (Diaz Cosin, 1972); у поздней акантеллы *А. petrochenkoi* — митохондрии, полисомы, комплексы Гольджи, липиды, гранулы, сходные

с выявляемыми в комплексе Гольджи, и фибриллярные тельца (Никишин, 1985). У Р. minutus типичная гранулярная ЭС не выявлена, но авторы допускают наличие гладкой ЭС (Crompton, Lee, 1965). У развивающихся личинок этого вида наряду с липидными каплями и частицами гликогена в войлочно-волокнистом слое весьма многочисленны митохондрии, элементы комплекса Гольджи и ЭС (Butterworth, 1969), которые, по мнению автора, принимают участие в синтезе материала фибрилл не только в этом, но и в других слоях тегумента. Столь широкое и нередко противоречивое разнообразие выявляемых субклеточных элементов можно было бы объяснить различиями в методиках подготовки препаратов. Однако более существенной причиной этого расхождения, на наш взгляд, являются трудности в интерпретации электронограмм не только из-за обилия и плотного расположения волокон, но и вследствие необычного вида некоторых органоидов. Так, имеются сведения о «нетипичной» организации митохондрий, выявляемых в тегументе некоторых взрослых акантоцефалов (Nicholas, Mercer, 1965). Бобровских (1992) вообще подвергает сомнению сведения о наличии митохондрий в тегмунте скребней и считает, что принимаемые за них образования являются скорее полимембранными тельцами, нежели митохондриями. По нашим данным, митохондрии необычного строения, имеющие короткие немногочисленные кристы, прозрачный матрикс и напоминающие пузырьки, наблюдались у поздней акантеллы A. petrochenkoi (Никишин, 1985). Не исключено, что и другие органоиды имеют необычную структуру.

Необычная форма митохондрий дала основание предполагать возможность их дегенерации у взрослых скребней (Nicholas, Mercer, 1965). Авторы отмечают, что митохондрии лучше развиты у незрелых червей. По их мнению, причиной угнетенного состояния митохондрий может быть то, что скребни являются факультативными анаэробами (Laurie, 1957, 1959, цит. по: Nicholas, Mercer, 1965). На примере *P. minutus* было показано, что в отличие от мелких с немногочисленными короткими кристами митохондрий взрослых червей (Cormpton, Lee, 1965) митохондрии развивающихся акантелл значительно крупнее и имеют хорошо развитую систему крист (Butterworth, 1969). Баттерворт объясняет это тем, что акантеллы в промежуточном хозяине находятся в окружении богатой кислородом гемолимфы и, таким образом, имеют, скорее всего, аэробный путь метаболизма, в отличие от анаэробного, свойственного взрослым червям.

Гистохимически в войлочно-волокнистом и в особенности в глубжележащем радиально-волокнистом слоях определяются значительные количества гликогена (Стотрton, 1963), однако электронно-микроскопически этот факт подтвержден только у M. moniliformis (Byram, Fisher, 1973), P. minutus (Crompton, Lee, 1965) u E. gadi (Lange. 1970). Известно, что гликоген «длительного хранения» откладывается в виде α-частиц 150—200 нм в диаметре, легко регистрируемых при использовании стандартных методик электронной микроскопии (Гайер, 1974). Гликоген этой модификации обнаружен в самых разных органах гельминтов, например у цестод в паренхимных клетках (Lumsden, 1965; Никишин, 1983). 8-частицы гликогена 20—40 нм в диаметре предназначены для «оперативного использования» и у паразитических плоских червей часто обнаруживаются в мышечных клетках (Lumsden, 1965), однако их идентификация на электронограммах затруднена ввиду их внешней схожести с рибосомами, но возможна после дополнительного подкрашивания срезов солями свинца (Гайер, 1974). По-видимому, именно δ-частицы гликогена наблюдали Бирам и Фишер, поскольку размеры этих частиц, по их данным, составляли 20-25 нм в диаметре. Ланге с уверенностью указывает на наличие δ-частиц гликогена в тегументе E. gadi (Lange, 1970), а Бобровских (1992) допускает такую возможность. у-частицы гликогена ввиду их малых размеров (3-4 нм в диаметре) обычными электронно-микроскопическими методиками не выявляются. Для точного определения, в каких формах и каких количествах происходит отложение гликогена в тегументе скребней, необходимы специальные цитохимические исследования; имеющиеся же данные позволяют лишь утверждать, что у изученных скребней гликоген в форме α-частиц не

необходимо иметь в виду возможность потери части гликогена в исследуемых образцах при их подготовке к исследованию (Lange, 1970).

Радиально-волокнистый слой. Термин предложен Мейером (Radiarfibrillenschicht) (Meyer, 1933). В настоящее время чаще используется название «радиальный слой» (radial layer). По сравнению с другими отделами тегумента этот слой наиболее толстый и отличается наибольшим разнообразием и количеством субклеточных структур. Весьма характерны для него многочисленные волокна, пересекающие его в направлении, перпендикулярном поверхности тела. Основания волокон связаны с внутренней цитоплазматической мембраной тегумента, вершины — с покровным комплексом (Богоявленский, Иванова, 1978). По своим гистохимическим характеристикам волокна радиально-волокнистого слоя сходны с волокнами войлочно-волокнистого слоя (Богоявленский, Иванова, 1978), однако строение и размеры их различаются у разных видов. У M. moniliformis эти волокна имеют в диаметре 0.71 мкм и образованы плотно расположенными параллельными филаментами 3 нм толщины (Byram, Fisher, 1973). Сходным образом они устроены у E. gadi, но диаметр их меньше и не превышает 0.51 мкм (Бобровских, 1992). У P. strumosoides их диаметр варьирует в пределах 0.1—0.25 мкм (Никишин, 1986). У Р. laevis волокна этого слоя в отличие от имеющихся в войлочно-волокнистом слое окружены элементами ЭС (Stranack e. a., 1966). У некоторых видов основания радиальных волокон имеют вид «прядеобразных пучков» (Барабашова, 1965). Имеются сведения о ветвлении этих волокон (Gupta, Lata, 1967; Hammond, 1967).

Характерной особенностью радиально-волокнистого слоя является также наличие в нем системы лакун. На электронограммах они представляют собой участки мелкозернистой цитоплазмы, в которой могут располагаться ядра или их фрагменты, а также включения в виде липидных капель, мультивезикулярных телец и скоплений пузырьков (Наштоп, 1967). Стенки лакун морфологически не оформлены, однако вдоль их границ нередко наблюдаются скопления фибриллярных элементов (Бобровских, 1992) или митохондрий и различных включений (Никишин, 1986). Возможно, именно обнаружение пограничных элементов привело к описанию лакун как «тонкостенных» каналов (Стотроп, Lee, 1965); позднее это мнение не подтвердилось. Гигантские лакуны, лишенные ядер, обнаружены вблизи внутренней цитоплазматической мембраны тегумента *E. gadi* (Бобровских, 1992). От окружающей цитоплазмы эти лакуны отделены толстыми волокнами, сходными с радиальными.

Ядра, как и лакуны, располагаются преимущественно во внутренней половине радиально-волокнистого слоя. Количество, распределение и микроморфология ядер тегумента хорошо известны и подробно проанализированы в монографии Богоявленского и Ивановой (1978), однако их ультраструктура изучена лишь нескольких видов. У М. moniliformis они достигают в размере 50 мкм и более, имеют «амебоидную» форму и характеризуются большим количеством ядрышек (по 5—6 на одном срезе). Каждое ядрышко имеет в диаметре по 3 мкм и более и состоит из гомогенной (центральной) и гранулярной (периферической) зон. Ядерный хроматин в виде мелких глыбок равномерно распределен по всей кариоплазме (Вугат, Fisher, 1973). Авторы подчеркивают, что у исследованного вида количество тегументальных ядер постоянно.

У $E.\ gadi$, напротив, в тегументе выявлено большое количество ядер разных форм и размеров, средние значения которых составляют 19×9 мкм (Бобровских, 1992). По данным Ланге (Lange, 1970), для этих ядер характерно отсутствие ядрышек и хроматина, однако, по другим данным, выявляются мелкие глыбки хроматина; кроме того, в некоторых из них обнаруживаются кристаллоподобные структуры (Бобровских, 1993). У цистакантов $P.\ strumosoides$ форма ядер тегумента также широко варьирует, но размеры их меньше — $8-9\times2.7-4$ мкм (Никишин, 1986). Строение ядрышек и хроматина не отличается от описанного у $M.\ moniliformis$.

Как уже отмечалось выше, радиально-волокнистый слой отличается от других участков тегумента обилием и наибольшим разнообразием органелл и включений (табл. 2). Богатый набор органелл, наличие ядер, а также развитая система лакун свидетельствуют в пользу вывода о том, что радиально-волокнистый слой тегумента

Таблица 2 Органеллы и включения, выявленные в радиально-волокнистом слое тегумента (ядра и фибриллярные элементы см. в тексте)

Table 2 O	roanelles and	inclusions	revealed in t	the radial-fib	er laver of tegument
Table 2. Of	iganienes and	Inclusions	revealed in	ille Taulai-IID	er laver of tegument

		,
Вид исследованных акантоцефалов	Органеллы радиально- волокнистого слоя	Включения радиально- волокнистого слоя
Moniliformis moniliformis (Ni- cholas, Mercer, 1965)	Митохондрии, комплекс Гольджи, ЭС, рибосомы (предпол.)	Липиды, плотные гранулы
M. moniliformis (Byram, Fisher, 1973)	Митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, гранулярная ЭС	Липиды, гликоген, вези- кулы
Macroacanthorhynchus hirudi- naceus (Diza Cosin, 1972)	Митохондрии, лизосомы, ЭС	Гликоген, везикулы
Echinorhynchus gadi (Lange, 1970)	Митохондрии, рибосомы	Липиды, гликоген, крис- таллы
E. gadi (Бобровских, 1992)		Кристаллы, мультимембран ные тельца
Pomphorhynchus laevis (Stranack et al., 1966)	Митохондрии, ЭС	Везикулы
Octospinifer macilentus (Beerman e. a., 1974)	Митохондрии, ЭС, рибосомы	Гликоген, везикулы
Acanthocephalus ranae (Ham- mond, 1967)	Митохондрии, комплекс Гольджи, рибосомы (предпол.)	Гликоген (предпол.), вези-кулы
Polymorphus minutus (Crompton, Lee, 1965)	Митохондрии, гладкая ЭС (пред- пол.)	Гликоген
P. minutus — развивающаяся акантелла (Butterworth, 1969)	Митохондрии, комплекс Гольджи, ЭС	Липиды
Arhythmorhynchus petrochen- koi — поздняя акантел- ла (Никишин, 1985)	Митохондрии, комплекс Гольджи, гранулярная ЭС, рибосомы	Липиды, ламеллярные тель ца, «полости» с разно- образным содержимым
Polymorphus strumosoides — цистакант (Никишин, 1986)	Митохондрии, комплекс Гольджи, гранулярная ЭС	Липиды
Polymorphus magnus — циста- кант (Никишин и др., 1994)	Митохондрии, рибосомы	*

свидетельствуют в пользу вывода о том, что радиально-волокнистый слой тегумента является метаболическим центром скребней (Crompton, 1963). Хотя специальных исследований и не проводилось, но можно предполагать, что в течение жизненного цикла скребней набор органелл в этом участке тегумента может несколько изменять ся. У развивающихся личинок здесь могут преобладать органоиды, участвующие гобразовании фибриллярных и иных компонентов тегумента, тогда как у взрослых скребней могут быть лучше развиты структуры, связанные с метаболическими процес сами, в частности трофическими. Возможно, именно разным возрастом исследован ных червей объясняются различия в результатах изучения состава радиально-волок нистого и других участков тегумента, полученных разными авторами.

Трубочковый слой. Изнутри тегумент ограничен складчатой цитоплазмати ческой мембраной 9.5 нм толщины (Вугат, Fisher, 1973). Иногда ее называю базальной мембраной. У скребней, как и у многих других червей, например плоски тегумент подостлан более или менее мощным слоем межклеточного материала (=базальной пластинкой), который нередко неправильно обозначают как слой соеди нительнотканных волокон.

Радиально-волокнистый слой у всех исследованных видов характеризуется нали чием многочисленных инвагинаций внутренней цитоплазматической мембраны и не

менее многочисленных везикул. Столь необычная структура этого участка тегумента дала основание некоторым исследователям выделить его в особый слой (базальный везикулярный слой — Graeber, Storch, 1978; везикулярная дерма — Stranack e. а. 1966; трубочковый слой — Никишин, 1986). Структура этого слоя несколько варьирует у разных видов. В ряде случаев инвагинации вздуты, а везикулы рассмат риваются как их поперечные срезы (Stranack e. a., 1966). У М. moniliformis инвагинации имеют вид трубочек 45 нм в диаметре и до 1.2 мкм длины (Вугат, Fisher 1973). У цистакантов Р. strumosoides в одних участках тегумента инвагинации расширены и напоминают везикулы, в других — выглядят как апикально расширенные трубочки 20—30 нм в диаметре и от 0.3 до 1.1 мкм длины, причем в их просветс иногда наблюдаются электронноплотные гранулы 14—15 нм в диаметре (Никишин 1986), предположительно имеющие липидную природу (Crompton, Lee, 1965).

Функциональная роль этого слоя, и в частности инвагинаций внутренней цитоплазматической мембраны, остается неясной. Кромптон и Ли, первыми обратившие внимание на его необычную структуру, подчеркивают его особую роль в обменных процессах, в частности в обмене липидов (Crompton, Lee, 1965). Предполагалось, что через инвагинации осуществляется транспортировка материалов (липидов?) из глубжележащих тканей или первичной полости в толщу тегумента (Hammond, 1967). По-видимому, нельзя исключить и обратный процесс. Наконец, признавая транспортную роль трубочкового слоя, образование инвагинаций и, как следствие, увеличение поверхности внутренней цитоплазматической мембраны тегумента рассматривались как приспособление для более прочной связи его с подлежащей тканью (Miller, Dunagan, 1985).

К внутренней плазматической мембране тегумента скребней *О. macilentus* сс стороны базальной пластинки прилежит слой материала, напоминающего гликокаликс (Веегтап е. а., 1974). На электронограммах он имеет вид тонкой электронноплотной прерывистой пластинки, разрывы которой соответствуют устьям инвагинаций базальной мембраны. Неясно, действительно ли этот материал является производным внутренней плазматической мембраны или же описываемый слой представляет собой самую наружную зону базальной пластинки.

Производные тегумента. К числу производных тегумента следует отнести шипики, обнаруживаемые у представителей многих видов, и микроворсинки, характерные для развивающейся акантеллы. Ультраструктура шипиков изучена у представителей всего двух видов скребней, относящихся к роду *Polymorphus*. Кромптон и Ли (Crompton, Lee, 1965) подтвердили ранее высказанное мнение (Crompton, 1963) о том, что у *P. minutus* шипики являются выростами войлочно-волокнистого слоя тегумента. По их данным, скелетную основу шипиков составляют фибриллы, ориентированные вдоль их продольной оси и собранные в виде конуса, покрытого поперечно-волокнистым слоем тегумента. Этот слой характеризуется меньшей толщиной и меньшим количеством каналов, длина которых также существенно меньше.

Согласно нашим данным, шипики *P. magnus* состоят из двух отделов: проксимального, погруженного в толщу тегумента, и дистального. Основным структурным элементом обоих отделов являются трубчатые структуры 21—25 нм в диаметре. Их дистальные концы преимущественно «светлые», только часть их заполнена электронноплотным содержимым. Снаружи этот отдел шипика покрыт покровным комплексом с очень немногочисленными порами, а в его центральной части располагаются продольно ориентированные цитоплазматические каналы, продолжающиеся и в проксимальный отдел. В последнем трубчатые структуры, заполненные плотным содержимым, располагаются в виде периферического цилиндра, а «светлые» заполняют его центральную часть. В основании шипиков выявляются значительные скопления митохондрий (Никишин и др., 1994).

Анализ тонкого строения шипиков подтверждает распространенное мнение о них как о дополнительных фиксаторных образованиях. В то же время необходимо иметь в виду, что скребни многих видов фиксируются в стенке кишечника хозяина только с помощью хоботка, а метасома, включая и покрытый шипиками ее передний отдел,

располагается свободно в просвете кишечника. В связи с этим было предложено рассматривать шипики в качестве структур, препятствующих прилеганию тела скребней к слизистой кишечника хозяина и способствующих формированию хозяиннопаразитарного пространства (Никишин и др., 1994).

Микроворсинки. Впервые микроворсинки были обнаружены у скребней *М. moniliformis* через 8 дней после заражения промежуточного хозяина. При этом было установлено, что именно микроворсинки ответственны за формирование большей части капсулы, окружающей личинку во время ее развития и жизни в промежуточном хозяине. Наличия микроворсинок у акантелл *Р. minutus* отмечено не было (Butterworth, 1969).

У развивающихся акантелл *P. anatis* короткие микроворсинки обнаруживаются на 10-й день после инвазии промежуточного хозяина (Nikishin, 1992). Диаметр их составляет 0.03—0.04 мкм, а длина варьирует от 0.08 до 0.33 мкм. Микроворсинки заканчиваются апикальными расширениями 0.06—0.12 мкм в диаметре, которые со временем отшнуровываются от «ножки» микроворсинки и участвуют в формировании центрального слоя окружающей капсулы. На 60-й день развития личинки микроворсинки отделяются от поверхности тегумента и вместе с материалом, выделенным через каналы поперечно-волокнистого слоя, образуют внутренний слой капсулы. На других этапах жизненного цикла микроворсинки не обнаруживаются.

Особенности дифференцировки тегумента

Тегумент пресомы. По-видимому, Граебер и Шторх имели в виду лишь общую схему строения тегумента, когда делали свой вывод об отсутствии «значительных различий в интегументе разных участков тела» (Graeber, Storch, 1978). На светомикроскопическом уровне показано, что у многих исследованных скребней тегумент пресомы значительно тоньше, чем метасомы, а строение его слоев упрощено (Богоявленский, Иванова, 1978). Этот вывод был подтвержден результатами электронно-микроскопических исследований. Для тегумента пресомы скребней Р. тіnutus характерен значительно менее толстый радиально-волокнистый слой, чем метасомы, в составе же тегумента хоботка отсутствуют типичные войлочно-волокнистый и радиально-волокнистый слои, а поперечно-волокнистый слой содержит каналы, заполненные в отличие от каналов метасомы электронноплотным содержимым (Crompton, Lee, 1965). По сравнению с метасомой количество каналов в тегументе пресомы незначительно, они имеют меньшую длину и более широкие просветы. У цистакантов этого же вида выявлены сходные особенности в строении тегумента пресомы (Butterworth, 1969). На поверхности тегумента пресомы A. ranae и P. laevis располагается мощный (участками до 1.5 мкм) слой электронноплотного материала, предположительно липидной природы (Hammond, 1967; Wanstall e. a., 1990).

В составе тегумента шейки скребней *М. hirudinacues* выделяются поперечно-волокнистый, модифицированный радиально-волокнистый и трубочковый слои, причем не отмечается наличия в тегументе каких-либо органелл, а из включений обнаружены лишь фиброзные элементы, липидные капли и везикулы (Diaz Cosin, 1972). В отличие от метасомы тегумент пресомы скребней *М. moniliformis*, полученных в условиях лабораторного эксперимента, характеризуется большим количеством митохондрий и фиброзных элементов (Taraschewski e. a., 1989). Поперечно-волокнистый и трубочковый слои имели меньшую толщину, зато в толще тегумента вблизи его основания был обнаружен так называемый «внутренний фиброзный слой», образованный продольно ориентированными и беспорядочно организованными фибриллами.

Ультраструктурные особенности разных участков тела отмечались и у скребней Neoechinorhynchus rutili (Taraschewski, 1989a). В отличие от метасомы тегмумент пресомы у этого вида покрыт слоем осмиофильного материала около 10 мкм толщи-

ны, поперечно-волокнистый слой примерно вполовину тоньше, каналы не имеют разветвлений и характеризуются суженными устьями, а в их просветах выявляется электронноплотный материал, сходный с материалом, покрывающим тегумент. Количество митохондрий в тегументе пресомы значительно превышает таковое в тегументе метасомы. Войлочно-волокнистый слой отмечен только в короткой шейке. У скребней *Paratenuisentis ambiguus* помимо сходных различий отмечено наличие в тегументе пресомы хорошо развитой (особенно вблизи крючьев) системы цистерн гранулярной ЭС, отсутствующей в тегументе метасомы (Taraschewski, 1989b).

Поперечно-волокнистый слой тегумента пресомы A. ranae подстилается системой тонких фибрилл, параллельных поверхности тела и свойственных только тегументу пресомы. Глубже располагается так называемый внутренний слой, аналогичный радиально-волокнистому слою метасомы, но в отличие от последнего содержащий продольно ориентированные фибриллы и меньшее количество субклеточных элементов. Кроме фибрилл здесь выявляются лакуны, митохондрии, предположительно рибосомы и несколько видов включений (Hammond, 1967). Подчеркивалось, что в тегументе пресомы всех исследованных скребней ядра не обнаружены (Богоявленский, Иванова, 1978). Аналогичные особенности отмечены и в тегументе пресомы цистаканта P. magnus (Никишин и др., 1994).

Относительно трубочкового слоя тегумента пресомы сведения также немногочисленны и противоречивы. У А. ranae этот слой содержит электронноплотные частицы, отсутствующие или редкие в аналогичном слое метасомы (Hammond, 1967). У Р. minutus, наоборот, складки внутренней плазматической мембраны в отличие от метасомы «более открыты и не содержат электронноплотных капель» (Crompton, Lee, 1965). У М. hyrudinaceus трубочковый слой пресомы развит в меньшей степени, чем в метасоме (Diaz Cosin, 1972), а у Р. magnus он вообще не развит (Никишин и др., 1994).

Тегумент пресомы отделяется от тегумента метасомы так называемой кутикулярной складкой (Богоявленский, Иванова, 1978), пересекающей все слои тегумента от покровного комплекса до внутренней цитоплазматической мембраны. Электронномикроскопическими исследованиями показано, что эта перегородка берет начало от неглубокой складки на поверхности тегумента и имеет фиброзную природу (Crompton, Lee, 1965; Taraschewski e. a., 1989).

Тегумент хоботковых крючьев. Ультратонкое строение тегумента крючьев изучено в еще меньшей степени, чем тегумента пресомы, что, очевидно, связано с еще большими методическими трудностями при подготовке электронно-микроскопических препаратов. В составе тегумента крючьев у скребней *P. ambiguus* выявлены поперечно-волокнистый, везикулярный и не имеющий аналога в тегументе метасомы «внутренний фиброзный» слои, а также сильно складчатая внутренняя цитоплазматическая мембрана (Тагаschewski, 1989b). Каналы (по терминологии автора — крипты) поверхностного и внутреннего слоев проникают до везикулярного слоя и переплетаются, образуя лабиринтоподобную структуру. Автор подчеркивает обильную осмиофилию тегумента, причем осмиофильный материал морфологически сходен с выявляемым на поверхности и в толще тегумента пресомы. У цистакантов и червей из окончательного хозяина в строении тегумента крючьев существенных различий не обнаружено. Сходные особенности структуры тегумента крючьев отмечены у скребней *N. rutili* (Тагаschewski, 1989a).

У цистакантов *P. magnus* тегумент крючьев также заметно отличается от тегумента пресомы (Никишин и др., 1994). В нем можно выделить покровный комплекс, поперечно-волокнистый слой, характеризующийся плотным матриксом и немногочисленными каналами, везикулярный слой с многочисленными везикулами, ламеллярными тельцами и единичными митохондриями, внутренний слой, отличающийся от везикулярного меньшим количеством органоидов и включений, и складчатую внутреннюю мембрану.

В отличие от представителей классов Eoacanthocephala и Palaeacanthocephala крючья скребней *M. hirudinaceus* вообще лишены тегумента (Zhao e. a., 1990).

У акантелл *М. moniliformis* формирующиеся крючья покрыты тонким цитоплазмати ческим слоем (по терминологии некоторых авторов, кутикулой), представляющих собой, по-видимому, несколько видоизмененный поперечно-волокнистый слой тегумента. В дальнейшем этот слой дегенерирует и у личинок в возрасте 180 дней выявляется в виде тонкой аморфной пленки, а у червей, извлеченных из окончатель ных хозяев, крючья были покрыты лишь осмиофильной липидной оболочкой (Taras chewski e. a., 1989).

Основные выводы

Тегумент скребней изученных видов имеет сходную ультратонкую организацию в включает в себя несколько слоев, различающихся по своему строению и функциям гликокаликс, покровный комплекс, включающий наружную цитоплазматическум мембрану, поперечно-волокнистый, везикулярный, войлочно-волокнистый, радиаль но-волокнистый и трубочковый слои. Последний ограничен базальной цитоплазма тической мембраной. Имеющиеся данные не позволяют определить видовые или иного (достаточного низкого) ранга таксономические особенности ультраструктуры тегу мента. Вместе с тем в строении некоторых участков тегумента обнаружены опреде ленные вариации, в ряде случаев соответствующие таксономии скребней на уровнумассов.

Существенные ультратонкие количественные и качественные различия выявлень в структуре тегумента пресомы и метасомы. Эти различия касаются большинств слоев тегумента и, по-видимому, связаны с фиксирующей функцией пресомы.

Одной из наиболее динамичных структур тегумента является гликокаликс. Извест ны четыре его модификации, соответствующие эмбриональной личинке, развиваю щейся акантелле, цистаканту и адультной форме. Неоднократная смена гликокаликс в течение жизненного цикла скребней отражает процессы адаптации скребней хозяевам разного ранга.

Покровный комплекс, напротив, по-видимому, наименее динамичная структур тегумента. Формируясь на стадии эмбриональной личинки, в дальнейшем он н претерпевает качественных и существенных количественных изменений. Это явле ние, уникальное среди паразитических червей, нуждается в дополнительном изу чении.

Основная функциональная роль поперечно-волокнистого слоя тегумента — всасывание необходимых материалов, причем образование системы каналов в сло рассматривается как механизм увеличения площади поверхности, участвующе в обменных процессах. Через каналы также осуществляются процессы секреции например выделение материала внутреннего слоя капсулы, окружающей личинку промежуточном хозяине.

Имеющиеся сведения не позволяют однозначно охарактеризовать состав и стро ение фиброзных элементов, органоидов и включений везикулярного, войлочно-волок нистого и радиально-волокнистого слоев тегумента. Противоречия в результата разных авторов вызваны необычной структурой некоторых органелл. Необходими специальные исследования этих участков тегумента с применением цитохимически методик.

Несмотря на слабую изученность механизма формирования тегумента, имеющиес сведения позволяют сделать вывод о том, что наиболее существенные качественны его изменения происходят на завершающих стадиях ларвогенеза — поздней акантел лы и цистаканта. К числу таких изменений следует отнести образование фиброзны элементов тегумента, синтез матрикса поперечно-волокнистого слоя, изменени структуры гликокаликса и др.

Работа выполнена при поддержке Международного научного фонда (конкурст 1992—1994 гг.).

Список литературы

- Барабашова В. Н. Тонкое строение покровных тканей двух видов скребней Filicollis anati: (Schrank, 1788) и Macroacanthorhynchus hirudinaceus (Pallas, 1781) // Матер. к науч. конф ВОГ. Ч. 3. М., 1965. С. 25—29.
- Бобровских Э. Ю. Ультратонкое строение покровов половозрелых скребней Echinorhynchus gadi (Acanthocephala) // Паразитология. 1992. Т. 26, вып. 5. С. 396—401.
- Богоявленский Ю. К., Иванова Г. И. Микроструктура тканей скребней. М.: Наука, 1978 C. 1—217.
- Вельш У., Шторх Ф. Введение в цитологию и гистологию животных. М.: Мир, 1976. 259 с. Гайер Г. Электронная гистохимия. М.: Мир, 1974. 488 с.
- Краснощеков Г. П. Морфология покровных тканей червей // Экология и морфология гель минтов позвоночных Чукотки. М.: Наука, 1979. С. 93—115.
- Краснощеков Г. П., Никишин В. П. Ультраструктура защитных оболочек личинок цес тод // Экология и морфология гельминтов позвоночных Чукотки. М.: Наука, 1979а. С. 116—132
- Краснощеков Г. П., Никишин В. П. Ультраструктура стенки цисты метацестод Aploparak sis polystictae и А. furcigera (Cestoda, Cyclophyllidaea) // Паразитология. 1979б. Т. 13 вып. 3. С. 250—256.
- Краснощеков Г. П., Никишин В. П. Адаптивное значение гликокаликса личинок цестод и акантоцефалов // Паразиты и болезни водных беспозвоночных. Тез. докл. 4-го симпоз M., 1986. C. 69-71.
- Краснощеков Г. П., Никишин В. П., Плужников Л. Т. Ультраструктура стенки цисть личинок цестод типа моноцерк // Паразитология. 1983. Т. 17, вып. 5. С. 391—396.
- Никишин В. П. Гистогенез эндоцисты цистицеркоидов разных модификаций // Биологические проблемы Севера. Тез. докл. 10-го симпоз. Ч. 2. Магадан, 1983. С. 326—327.
- Никишин В. П. Ультраструктура покровных тканей поздней акантеллы Arhythmorhynchus petrochenkoi (Acanthocephala: Polymorphidae) // Паразитология. 1985. Т. 19, вып. 4 C. 306—313.
- Никишин В. П. Тонкое строение стенки метасомы цистаканта скребня Polymorphus strumosoides (Acanthocephala, Polymorphidae) // Паразитология. 1986. Т. 20, вып. 5. С. 403—408
- (Никишин В. П.) Nikishin V. P. Formation of the capsule around Filicollis anatis in its inetmediate host // Journ. Parasitol. 1992. Vol. 78, N 1. P. 127—137.
- Никишин В. П., Краснощеков Г. П. Ультраструктура покровов и «железы проникновения» аканторов Polymorphus magnus (Acanthocephala: Polymorphydae) // Паразитология 1990. Т. 24, вып. 2. С. 135—139.
- Никишин В. П., Плужников Л. Т., Леонов С. А. Ультраструктура покровов цистакантог Polymorphus magnus (Acanthocephala, Polymorphidae) // Паразитология. 1994. Т. 28, вып. 1 C. 52—59.
- Beermann I., Arai H. P., Costerton J. W. The ultrastructure of the lemnisci and body wall of Octospinifer macilentus (Acanthocephala) // Canadian Journ. Zool. 1974. Vol. 52, N 5. P. 533—
- Bullock W. L. Histochemical studies on the Acanthocephala: II. The distribution of glycogen and fatty substances // Journ. Morphol. 1949. Vol. 84. P. 201-226.
- Butterworth P. The development of the body wall of Polymorphus minutus (Acanthocephala) ir its intermediate host Gammarus pulex // Parasitology. 1969. Vol. 59. P. 373—388. Byram J. E., Fisher F. M. The absorptive surface of Moniliformis dubius (Acanthocephala)
- 1. Fine structure // Tissue and Cell. 1973. Vol. 5, N 4. P. 553—579.
- Cable R. M., Dill W. T. The morphology and life history of Paulisentis fractus Van Cleave and Bangham, 1949 (Acanthocephala: Neoechinorhynchidae) // Journ. Parasitol. 1967. Vol. 53, N 4 P. 810—817.
- Chappell L. H. The biology of the external surface of helminth parasites // Proceed. Roy. Soc. Edinburgh. 1980. Vol. 79B. P. 145—171.
- Cho B. C. Electron microscopic and histochemical studies on the epicuticle of Echinorhynchus gadi Acanthocephala // Korean Journ. Parasitol. 1981. Vol. 19, N 1. P. 45-54.
- Crompton D. W. T. Morphological and histochemical observations on Polymorphus minutus (Goeze, 1782) with special reference to the body wall // Parasitology. 1963. Vol. 53, N 3-4 P. 663-685.
- Crompton D. W. T., Lee D. L. Structural and metabolic components of acanthocephalan body wall // Parasitology. 1963. Vol. 53. P. 3-4.
- Crompton D. W. T., Lee D. L. The fine structure of the body wall of Polymorphus minutus (Goeze, 1782) (Acanthocephala) // Parasitology. 1965. Vol. 55, N 2. P. 357-364.

- Crompton D. W. T., Nickol B. B. Biology of the Acanthocephala. Cambridge: University Press, 1985. 519 p.
- Diaz Cosin D. J. La pared del cuerpo de Macroacanthorhynchus hirudinaceus // Bol. Real. soc. esp. histor. natur. Sec. biol. 1972. Vol. 70, N 3-4. P. 239-270.
- Gabrion C., Gabrion J. Etude ultrastructurale de la larva de Anomotaenia constricta (Cestoda, Cyclophyllidea) // Zeit. Parasitenk. 1975. Bd 49, H. 2. S. 161—177.
- Graeber K., Storch V. Elektronmikroskopische und morphometrische Untersuchungen am Integument der Acanthocephala (Aschelminthes) // Zeit. Parasitenk. 1978. Bd 57, H. 2. S. 121—135.
- Gupta N., Lata V. On the morphology, anatomy and histology of Echinopardalis pardalis acanthocephalan parasite of Felis domestica in India // Res. Bull. Panjab. Univ. 1967. Vol. 18, N 3—4. P. 395—403.
- Hammond R. A. The fine structure of the trunk and praesoma wall of the Acanthocephalus ranae (Schrank, 1788), Luhe, 1911 // Parasitology. 1967. Vol. 57, N 3. P. 475-486.
- Lange H. Über Struktur and Histochemie des Integuments von Echinorhynchus gadi Muller (Acanthocephala) // Zeit. Zellforsch. Microscop. Anat. 1970. Bd 104. S. 149—164.
- Laurie J. S. The in vitro fermentation of carbohydrates by two species of cestodes and one species of acanthocephala // Exper. Parasitol. 1957. Vol. 6. P. 245—260.
- Laurie J. S. Aerobic metabolism of Moniliformis dubius (Acanthocephala) / Exper. Parasitol. 1959. Vol. 8. P. 188-197.
- Lee D. L. The structure and composition of the helminth cuticle // Adv. Parasitol. 1966. Vol. 4. P. 187-254.
- Lee D. L. The structure of the helminth cuticle // Adv. Parasitol. 1972. Vol. 10. P. 347-379.
- Lums den R. D. Macromolecular structure of glycogen in some cyclophellidean and trypanorhynch cestodes // Journ. Parasitol. 1965. Vol. 51, N 4. P. 501-515.
- Lums den R. D. Surface ultrastructure and cytochemistry of parasitic helminths // Exper. Parasitol. 1975. Vol. 37, N 2. P. 267-339.
- Meyer A. Acanthocephala / Dr H. G. Bronn's Klassen und Ordnungen des Tierreichs. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft MBH. 1933. Bd 4. S. 333-582.
- Miller D. M., Dunagan T. T. Functional morphology // Biology of the Acanthocephala. Ed. D. W. T. Crompton, B. B. Nickol. Cambridge University Press, 1985. P. 73—123.
- Monne L. On the external cuticles of various helminths and their role in the host parasite relationships. A histochemical study // Arch. Zool. 1959. Vol. 12. P. 343—358.
- Nicholas W. L. The biology of the Acanthocephala // Adv. Parasitol. 1967. Vol. 5. P. 205—315. Nicholas W. L. The biology of the Acanthocephala // Advances in Parasitology. 1973. Vol. 11. P. 671-706.
- Nicholas W. L., Mercer E. H. The ultrastructure of the tegument of Moniliformis dubius (Acanthocephala) // Quarterly Journ. Micr. Sci. 1965. Vol. 106, N 2. P. 137-146.
- Rees F. G. The ultrastructure of the cysticercoid of Tatria octacantha Rees, 1973 (Cyclophyllidea, Amabillidae) from the damselfly nymphs Pyrrhosoma nymphulla, Sulz and Enalligma cyathigerum, Charp // Parasitology. 1973. Vol. 67, N 1. P. 85—103.
- Rothman A. H. Ultrastructural enzyme localization in the surface of Moniliformis dubius (Acanthocephala) // Exper. Parasitol. 1967. Vol. 21, N 1. P. 42-46.
- Rothman A. H., Rosario B. The structure of the surface of Macroacanthorhynchus hirudinaceus as seen with the electron microscope // Journ. Parasitol. 1961. Vol. 47, N 1. P. 25.
- Ruff M. D., Uglem G. L., Read C. P. Interactions of Moniliformis dubius with pancreatic enzymes // Journ. Parasitol. 1973. Vol. 59, N 5. P. 839—843.
 Stranack F. R., Woodhouse M. A., Griffin R. L. Preliminary observations on the ultrastruc-
- ture of the body wall of Pomphorhynchus laevis (Acanthocephala) // Journ. Helminthol. 1966. Vol. 40, N 3—4. P. 395—402.
- Taraschewski H. Host-parasite interface of Neoechinorhynchus rutili (Eoacanthocephala) in naturally infected salmonids // Journ. Fish. Diseases. 1989a. Vol. 12. P. 39-48.
- Taraschewski H. Host-parasite interface of Paratenuisentis ambiguus (Eoacanthocephala) in naturally infected eel and in laboratory-infected sticklebacks and juvenile carp and rainbow trout // Journ. Parasitol. 1989b. Vol. 75, N 6. P. 911-919.
- Taraschewski H., Sagani C., Mehlhorn H. Ultrastructural study of the host-parasite interface of Moniliformis moniliformis (Acanthocephala) in laboratory-infected rats // Journ. Parasitol. 1989. Vol. 75, N 2. P. 288-296.
- Wanstall S. T., Thomas J. S., Robotham P. M. J. Pomphorhynchus laevis Muller: structure of the praesomal integument and associated tissues // Acta parasitol. polon. 1990. Vol. 35, N 2. P. 119—130.

- Wright R. D., Lumsden R. D. Ultrastructural and histochemical properties of the acanthocephalan epicuticle // Journ. Parasitol. 1968. Vol. 54, N 6. P. 1111—1123.
- Wright R. D., Lumsden R. D. Ultrastructure of the tegumentary pore-canal system of the acant-hocephalan Moniliformis dubius // Journ. Parasitol. 1969. Vol. 55, N 5. P. 993—1003.
- Wright R. D., Lumsden R. D. The acanthor tegument of Moniliformis dubius // Journ. Parasitol. 1970. Vol. 56, N 1. P. 727—735.
- Zhao B., Taraschewski H., Mehlhorn H. Light- und elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Histopathogenitat von Macroacanthorhynchus hirudinaceus (Archiacanthocephala) in experimentell infizierten Hausschweinen // Parasitol. Res. 1990. Vol. 76, N 4. P. 355—359.

Международный научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН, Магадан, 685000 Поступила 10.10.1995

ULTRASTRUCTURAL MORPHOLOGY OF TEGUMENT IN ACANTHOCEPHALA

V. P. Nikishin

Key words: Acanthocephala, tegument, morphology, ultrastructure.

SUMMARY

Different cited and author's data on the ultrastructural morphology of tegument in Acanthocephala are analized and discussed.