

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 598.112.27(574.14)

ПУСТЫННЫЙ ГОЛОГЛАЗ *ABLEPHARUS DESERTI* STRAUCH, 1868 (REPTILIA: SCINCIDAE) В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ (КАЗАХСТАН)

М. В. Пестов

Общество охраны амфибий и рептилий при экоцентре «Дронт»
Россия, 603001, Нижний Новгород, Рождественская, 16-д
E-mail: vipera@dront.ru

Поступила в редакцию 02.10.2014 г.

Представлен факт обнаружения изолированной популяции пустынного гологлаза *Ablepharus deserti* в Мангистауской области Казахстана.

Ключевые слова: *Ablepharus deserti*, Мангистау, Казахстан.

Пустынный гологлаз (*Ablepharus deserti* Strauch, 1868) распространён в Южном Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Северном Таджикистане и Восточном Туркменистане (Ананьева и др., 2004). Современный ареал вида разрознён, известны изолированные периферийные популяции на значительном удалении от основной области распространения (Еремченко, Щербак, 1986). В доступной нам литературе более подробная информация о распространении *A. deserti* (в том числе в виде картосхем) представлена в сводках К. П. Параскива (1956, карта 39), А. Г. Банникова с соавторами (1977, карта 70), В. К. Еремченко и Н. Н. Щербака (1986, рис. 24) и З. К. Брушко (1995, рис. 42). Во всех этих источниках в качестве западного предела распространения данного вида в Казахстане указывается Приаралье.

В то же время ещё А. М. Никольский (1915) указывал на наличие в коллекции Зоологического института РАН единственного экземпляра пустынного гологлаза с Устюрта, собранного Ф. И. Базинером в 1843 г., без точного локалитета (инв. № 568). К. П. Параскив (1956) также ссылается на данную находку в тексте и высказывает предположение: «Возможно, что этот экземпляр обнаружен в Казахской части Устюрта» (1956). В более поздних сводках (Банников и др., 1977; Еремченко, Щербак, 1986) эта давняя находка вовсе не упоминалась. З. К. Брушко (1995) уже со ссылкой на монографию К. П. Па-

раскива (1956), т.е. фактически имея в виду все ту же единственную находку Ф. И. Базинера 1843 г., не исключает возможности обитания пустынного гологлаза в казахстанской части Устюрта. В последнем по времени появления и наиболее полном обзоре фауны амфибий и рептилий Мангистауской области, включающей в себя п-ов Мангышлак и значительную часть трансграничного плато Устюрт, обитание данного вида в регионе также признается потенциально возможным (Дуйсебаева, 2012). Таким образом, вопрос об обитании гологлаза на Устюрте и сопредельной территории Мангышлака до последнего времени оставался открытым.

Необходимо также отметить, что *A. deserti*, являясь жителем пустынной зоны, все же предпочитает относительно мезофильные микробиотопы с обильной растительностью и, по возможности, близостью пресных водоёмов (Брушко, 1995). Подобные места обитания на территории Мангистауской области (Мангистау) весьма локальны и немногочисленны.

14 сентября 2013 г. на окраине г. Актау (п-ов Мангышлак, 43 38.02' с.ш., 51 12.98' в.д.) был отловлен взрослый экземпляр гологлаза, определённый как *A. deserti* (инв. № 878/1 в коллекции Института зоологии Министерства образования и науки Республики Казахстан; рисунок). Ящерица была поймана на территории коттеджного посёлка, созданного на месте бывшего

садового товарищества, на орошаемом участке с посадками плодовых кустарников и деревьев и обильной рудеральной травянистой растительностью. Днем позже на этом же участке была поймана ювенильная особь гологлаза. По словам владельцев участка, подобных ящериц они и ранее неоднократно встречали во время приусадебных работ. Вокруг коттеджного поселка, площадь которого составляет несколько десятков гектаров, расположена типичная приморская равнина с засоленными почвами и зарослями тамариска (*Tamarix* sp.). На примыкающих к участку хозяйственных и жилых постройках обитает каспийский геккон (*Tenuidactylus caspius* (Eichwald, 1831)).



Пустынный гологлаз (*Ablepharus deserti*), добытый в окрестностях г. Актау 14.09.2013 г.

В 2014 г. при повторном обследовании этого поселка было установлено, что здесь обитает устойчивая популяция *A. deserti* с плотностью не менее 10 экз./га. Специальные поиски гологлазов за пределами поселка, а также в немногочисленных мезофильных местах обитания в Мангистауской области (Ботанический сад в г. Актау, берега пресного озера в урочище Саура к северу от г. Актау, окрестности пресного родника в урочище Кугусем в Устьюртском ГПЗ) успеха не имели. Пустынный гологлаз не был отмечен нами и в ходе масштабных герпетологических исследований в Мангистау в 2008 – 2014 гг., результаты которых частично опубликованы (Пестов, Нурмухамбетов, 2012).

Таким образом, вероятно впервые за последние 170 лет, нами было подтверждено обитание пустынного гологлаза в Мангистау. Выявленный локалитет удален не менее чем на 600 км от известных мест обитания данного вида в Приаралье. Локальное обитание фактически синантропной популяции *A. deserti* в мезофильных условиях коттеджного поселка в окрестностях г. Актау и отсутствие находок данного вида на прочей территории Мангистау не исключают возможности случайной интродукции вида. Возможно, ящерицы были завезены сюда вместе с саженцами плодово-ягодных культур из южных или юго-восточных регионов Казахстана. Очевидно, что для окончательного определения статуса обнаруженной нами популяции *A. deserti* в Мангистау необходимы дополнительные исследования.

Благодарности

В. В. Ротмистрову – за участие в экспедиционных исследованиях в Мангистау; К. Д. Мильто – за консультации по тексту сообщения; А. Н. Гнетневу – за помощь в поиске необходимой литературы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ананьева Н. Б., Орлов Н. Л., Халиков Р. Г., Даревский И. С., Рябов С. А., Барабанов А. В. 2004. Атлас пресмыкающихся северной Евразии (таксономическое разнообразие, географическое распространение, природоохранный статус) / Зоол. ин-т РАН. СПб. 232 с.
- Банников А. Г., Даревский И. С., Ищенко В. Г., Рустамов А. К., Щербак Н. Н. 1977. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. М.: Просвещение. 414 с.
- Брушко З. К. 1995. Ящерицы пустынь Казахстана. Алматы: Конжык. 232 с.
- Дуйсебаева Т. Н. 2012. Обзор фауны амфибий и рептилий Мангистауской области // *Selevinia*. С. 59 – 65.
- Еремченко В. К., Щербак Н. Н. 1986. Аблефаридные ящерицы фауны СССР и сопредельных стран. Фрунзе: Илим. 171 с.
- Никольский А. М. 1915. Пресмыкающиеся (Reptilia). Т. I. Chelonia и Sauria. Пг.: Импер. акад. наук. 534 с. (Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Императорской Академии наук).
- Параскив К. П. 1956. Пресмыкающиеся Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР. 228 с.
- Пестов М. В., Нурмухамбетов Ж. Э. 2012. Амфибии и рептилии Устьюртского государственного заповедника (Казахстан) // *Selevinia*. С. 77 – 82.

М. В. Пестов

**DESERT LIDLESS SKINK *ABLEPHARUS DESERTI* STRAUCH, 1868
(REPTILIA: SCINCIDAE)
IN THE MANGISTAU REGION (KAZAKHSTAN)**

M. V. Pestov

Society of Amphibians and Reptiles Conservation
16-d Rozhdestvenskaya Str., Nizhny Novgorod 603001, Russia
E-mail: vipera@dront.ru

An isolated population of the desert lidless skink *Ablepharus deserti* in the Mangistau region of Kazakhstan was discovered.

Key words: *Ablepharus deserti*, Mangistau, Kazakhstan.